

吳鞠通先生醫案

吳鞠通先生醫案卷四

婦科目錄

疝瘕

胎前

產後

陰吹

交腸

調經

帶下

臃燥

兒科目錄

痘症

瘰

癧

食積

瀉泄

咳嗽

暑溫

伏暑

吳鞠通先生醫案 卷四

後學 高德僧汝賢重錄  
表吉生慶元校刊

痢瘕

壬戌八月 廿三日 胡氏 二十歲 脈沈而細 體厚而白 陽虛可知 奔豚從少腹上攻 心胸發

作欲死 氣四則已 嘔酸 痼瘕 大便結燥 頭暈 心悸 皆肝經累及衝脈為病

桂枝尖 二錢 降香 三錢 川楝子 一錢 淡吳萸 三錢 廣木香 一錢

炒全歸 三錢 靈連炭 一錢 炒小茴香 三錢 川芎 一錢 廣鬱金 二錢

青皮 三錢 兩頭尖 二錢 煮三杯分三次服 三帖

廿六 桂枝 一錢 煨香附 三錢 全歸 三錢 降香 三錢

炒小茴香 三錢 川芎 五分 半夏 三錢 淡吳萸 二錢

廣皮 二錢 青皮 二錢 靈連炭 一錢 煮三杯分三次服 三帖

廿九日

紫石英五錢

生香附三錢 淡吳茱三錢

降香末三錢

廣皮二錢

桃仁泥二錢 川練子三錢

炒全歸三錢

兩頭尖三錢

炒小茴香三錢 青皮一錢五分

煮三杯分三次服

九月初三日 通補八脈

生鹿角四錢

肉桂八分

降香末三錢

紫石英五錢 生研細

杞子三錢

炒全歸三錢 桂枝尖二錢

生香附三錢

炒小茴香三錢

煮三杯分三次服

乙丑四月廿七日

章氏七十 老年癃泄小腹堅痛上連季脇小便短赤之極六脈洪數

法宜急調陰絡且令得小便庶可痛減進食

川棟子三錢

歸身三錢

藏紅花一錢

降香末三錢

良姜一錢五分

兩頭尖三錢

炒小茴香三錢

琥珀三分

非白汁匙三 生香附三錢 口麝八錢與琥珀同研極細沖 煮三杯分三次服

日八 六脈洪數較前更甚於前方內去兩頭尖加 川黃連一錢

日九 脈小則病退較平人猶覺大也

川棟子三錢 檳榔一錢五分 淡吳萸二錢 降香末三錢

青皮一錢五分 真雅連一錢 炒小茴香三錢 琥珀四分

藏紅花八分 生香附三錢 歸橫錢八分 口麝五釐

煮三杯分三次服

日三十 病勢少減惟嘔惡不食兼與和胃

烏藥二錢 製半夏三錢 檳榔一錢五分 歸錢二錢

降香末三錢 紅花五分 川連一錢五分 淡吳萸三錢

血珀三分 青皮二錢 炒小茴香三錢 口麝五釐與血珀同研極細沖

頭煎八分兩茶杯二煎一茶杯分三次服

五月初一日 得下瘕聚皆衝任脈為病數日來急通陰絡效已不少但六脈洪數有

力謹防下部生瘡凡瘡皆屬君火瀉心者必瀉小腸且膽無出路必借小腸以為出路小腸火腑非苦不通

蘆薈一錢

龍膽草三錢

山連一錢五分

半夏三錢

川棟子三錢

青皮一錢五分

歸鬚三錢

生香附三錢

琥珀三分

烏藥二錢

淡吳茱三錢

檳榔二錢

口腐五釐

小茴香三錢

煮三杯分三次服

初三日 今日脈雖小而泄較多

吳茱三錢

降香末三錢

草薢三錢

良姜三錢

生香附三錢

烏藥二錢

半夏二錢

川棟子三錢

歸鬚二錢

青皮一錢五分

小茴香三錢

廣皮二錢

煮三杯分三次服

初三 大瀉泄痛甚且有瘀血積滯法宜通陽和絡

吳黃 三錢

降香末 三錢

紅花 五分

川棟子 三錢

琥珀 三分

歸身 三錢

生香附 三錢

口腐 五釐

川椒炭 三錢

青皮 一錢

川連 一錢

煮三杯分三次服

初四

脈證俱減惟脇腹脹惡仍用前法而小變之

川棟子 三錢

安桂 一錢

川椒炭 三錢

降香末 三錢

青皮 二錢

生香附 三錢

淡吳黃 三錢

紅花 五分

廣鬱金 二錢

小茴香 三錢

廣皮 二錢

川黃連 一錢

煮三杯分三次服

初五

於前方內去川椒炭再服一帖

初六

老年久病勢已緩且減其製間服烏藥散五分不痛不服

吳氏醫案

痢症

三



半夏 六錢

炒小茴香 五錢  
川連 五錢

全歸 七錢  
色 三錢

川棟子 三錢

吳萸 五分  
炮淡 一錢  
桂心 一錢  
研細沖

生香附 三錢

廣皮 一錢

紅花 五分

煎二杯分二次服

初七

老年久病諸症悉減未便純任攻伐議運補兼施能入奇經者宜之

炙龜板 三錢

全歸 三錢  
黃酒炒

小茴香 少服黃酒  
炒黑三錢 鹿角霜 二錢

艾炭 一錢

生香附 三錢

枸杞子 炒二錢

砂仁 一錢  
五分

煎二杯分二次服

廿六

王氏 濁陰上僭滴水不下痛脹不可忍而又加以大瘕泄六脈幾

於無陽殆哉

炒川椒 八錢

華撥 四錢

小枳實 五錢

淡吳萸 六錢

良姜 三錢

焦白芍 三錢

安邊桂 去粗皮 五錢  
紅麴 三錢

炒黃芩 一錢

老厚樸 五錢

歸身 一錢  
五分

炒川連 二錢

日初  
一  
九梔水煮成三碗加桂再煮得八分三碗分三次服

渴飲之上攻者少平積滯之下趨者未淨且有黑暗紫熾之形思有形有質之邪非急趨不可誠溫下法欲便先痛便後痛減是其可下之據也再以體虛而論急逐其實正所以救其虛也不然經綿日久終歸於憊反欲下而不能矣古人所謂網開一面也

桂心 三錢

生大黃

五錢

炒黃芩

二錢

川椒

炒黑五錢

炒白芍 三錢

紅薤 二錢

厚樸 三錢

淡吳萸 五錢

廣皮 三錢

歸尾 二錢

炒川連 二錢

水八盃煮成三杯先服二盃以知消息之即得快大便方已之意

化癰回生丹方

鱉甲膠 一觔

人參 六兩

桃仁 三兩

益母膏 八兩

熟地 四兩

紅花 二兩

公丁香 三兩

白芍 四兩

麝香 二兩

小茴炭 三兩 歸尾 四兩

乾漆 二兩

五靈脂 二兩

杏仁 三兩 川芎 二兩

京三稜 二兩

蘇木 三兩

香附 二兩 蘇子霜 二兩

安桂 二兩

阿魏 二兩

元胡索 二兩 降香 二兩

艾炭 二兩

片姜黃 二兩

吳黃 二兩 良姜 二兩

兩頭尖 二兩

乳香 二兩

水蛭 香油炒 川椒炭 二兩

沒藥 二兩

斑蝥 二兩

蒲黃炭 一兩 大黃 八兩

此物為細末以糯米醋二斤半熬濃晒乾為末再加醋熬如是三次四乾末之

右藥其為細末以雞甲大黃益母三膠和勻再加煉蜜為丸重一錢五分蠟皮封護用時溫開水和空心服瘕甚之症黃酒下

一治瘕結不散不痛

一治瘕發痛甚

一治血痺

一治瘧母左脇痛而寒熱者

一治婦女乾血癆症之屬實者

一治婦女經前作痛古謂之痛經者

一治婦女將欲行經而寒熱者

一治婦女將欲行經誤食生冷腹痛者

一治婦女經閉

一治婦女經來紫黑甚至成塊者

一治產後瘀血少腹痛拒按者

一治腰痛之因於跌撲死血者

一治跌撲昏暈欲死者

一治金瘡棒瘡之有瘀滯者

馬氏二十歲  
四歲瘕痛十數年不愈三日一發或三日十日一發或半月一發發時痛

吳氏醫案

瘕瘕

不能食無一月不發者與天台烏藥散發時服二錢痛輕服一錢不痛時服三五分一年以外其痕化盡永不再發

史氏三十歲少腹痛不可忍六脈弦細而緊其夫曰妊孕業已足月想欲產耳余曰胎脈流利弦緊乃賊克之脈此痕也見病脈故不見胎脈與辛香流氣飲二帖而痛止三日後大生如故

乙酉八月三十日 王室女二十歲 肝鬱結成癥瘕左脈沈伏如無右脈浮弦下焦血分閉塞極矣此乾血癆之先聲也急宜調情志切戒怒惱時刻能以恕字待人則病可愈矣治法以宣絡爲要

新絳紗 三錢 桃仁泥 三錢 廣鬱金 三錢 蘇子霜 三錢

旋覆花 三錢 歸橫鬚 三錢 降香末 三錢 公丁香 一錢五分

煮三杯分三次服

九月初四日 服前藥四帖六脈沈伏如故絲毫不起病重則藥輕於前方內加

川椒炭 三錢 良姜 二錢

再用化癥回生丹早晚各服一丸服至癥瘕化盡為度三四百丸均未  
可定斷不可改絃易轍也

十月十七日 癥瘕瘀滯服宣絡溫經藥二十二劑化癥回生丹四十餘丸業已見效

不淺脈亦生動經亦暢行藥當減其製化癥回生丹每早空心只服一丸  
效則不必加切戒生冷猪肉介屬可收全功

新絳紗 三錢 丹皮 五錢 廣鬱金 二錢 香附 三錢

旋覆花 包三錢 歸橫鬚 二錢 降香末 二錢 廣皮 二錢

蘇子霜 一錢 五分 煮三杯分三次服

此方常服可全愈

胎前

癸亥七月 汪氏三十 痢疾古稱滯下 沉久病脈實欲便先痛便後痛減其為積  
初五日 吳氏醫案 胎前 六

滯未清無疑非網開一面不能補虛議溫下法所以敢用此者經謂有故無殞故無殞也

生大黃 三錢

官桂 一錢五分

焦神麴 二錢

炒白芍 二錢

黃芩 一錢五分

南查炭 一錢

老厚樸 二錢

雲連 一錢

廣木香 一錢

桃仁泥 一錢 歸鬚 一錢

水四茶杯煮成六分三茶杯先服一杯候四個時辰問病人再便腹不痛止後服若欲便之先痛減其半再服一分之半痛仍照前再服一分其第三次亦如前候法

日初七服前藥全然不痛

焦白芍 一錢五分

茯苓 二錢

廣木香 八分

黃芩炭 八分

雲連 酒炒 三分

老厚樸 一錢

焦茅朮 一錢

蓮子 二錢

廣皮炭 一錢

煮二杯分二次服

初九 帶下腹痛已去七八咳嗽冷痰脈近緩仍然雞鳴欲便譫宣滯之中兼醒

脾胃兩陽

茯苓塊 四錢

厚樸 二錢

製茅朮 三錢

焦白芍 二錢

半夏 二錢

煨肉果 一錢

五分黃芩炭 二錢

廣皮 一錢

廣木香 一錢

煮三杯分三次服

黃氏三十 死胎不下已三日矣六脈乳大心悸甚汗大出而喘按俗派愈以平

胃散加煨硝茲陽虛欲脫前法下咽卽死矣與救逆法護陽斂汗陰陽和而胎自下

遠參 三錢

牡蠣 五錢

蓮子 五錢

雲苓 四錢

龍骨 五錢

炙甘草 三錢

麥冬 三錢

林砂拌

煮三盃服一盃而汗減喘定服二盃而死胎自下服三盃而神定以天

根月窟膏兩補下焦陰陽法兩月而安



關氏三十歲難產三日不下脹大年長陰氣不足交骨不開

生龜板 八兩

煮兩碗盡劑而生生後補陰而安

漏氏四十歲難產五日不下呼吸定息脈再至陽氣不充裏寒且有癥瘕與溫經

肉桂 五錢

靈苓塊 五錢 川芎 二錢

人參 一錢

川椒炭 三錢

全歸 三錢

煮三杯分三次服盡劑而生大小無恙

又產後惟腹中瘧痛甚仍以前方內加

炮薑 四錢

淡吳萸 三錢

炒小茴香 三錢

桃仁 三錢

煮三盃分三次服服後下血塊長六七寸者二枚畧如狗形無腸腹中

尚有一枚不敢再攻以服逆補奇經丸化淨而身體大健

史氏

妊娠七月溫熱用承氣大下已數溫熱門中胎氣全然無傷其所生之子已三十三歲矣

范氏二十歲每殞胎必三月肝虛而熱業已殞過三次考古法用桑寄生湯按寄  
生湯內用人參五錢又非二三帖所能保況業已見紅卽人參甚便亦不  
能定其必可以保況力不足者多能用參者少且寄生未定其桑也卽寄  
生亦復不少藥不真焉能見效內經謂上工治未病何若於未孕未殞之  
前先用藥爲妙故用專翁大生膏一料計二十四觔每日服一兩分早中  
晚三次一料盡又受孕自二百四十天仍舊不保其夫來報余甚慚愧自  
以爲計之不善也其夫云不然前次之殞滑不可解若不知者然此次之  
殞宛如大生艱難萬狀是藥力已到而未足其補之量也皆久滑難補之  
故望先生爲加減急急再做一料乘月內服起必可大生也於是照前方  
加重分量其計生料八十斤外加嫩桑茸二觔作細末和膏內得乾丸藥  
三十觔以後連生四五胎無一小產者

專翁大生膏

酸甘鹹法

吳氏醫案

胎前

八

無效月經人參二筋

熟地黃三筋 杞子一筋

白芍二筋

沙蒺藜一筋

牡蠣一筋 茯苓二筋

五味子半筋

海參二筋 刺六者

麥冬二筋 不去心 烏骨雞一筋 雌雄對

鮑魚二筋

龜版一筋 另熬膠

猪脊髓一筋 蓮子二筋 湖南

鱉甲一筋 另熬膠

羊腰子八對

芡實三筋 阿膠二筋

鷄子黃去白二筋 十圓

白蜜一筋

右藥分四鍋鍋用忌鐵器攪以有情歸有情者一無情歸無情者二文火細

煉三晝夜去渣再熬六晝夜陸續合為一鍋煎煉成膏末下三膠合蜜和

勻以方中有粉無汁之茯苓白芍蓮子芡實為末合膏為丸每服二錢漸

加至三錢日三服一日一兩期年為度每殞胎必三月肝虛而熱者加天

冬一筋同熬膏再加鹿茸二十四兩為末本方以陰生於八成於七故用

方用陽生於七成於八三八二十四之偶方以生胎或加桑寄生一筋

之湯也古法通方多用陽守方多用奇陰陽互也

方論夫乾其動也直其靜也專是以大生焉夫坤其動也闢其靜也翕是以廣生焉此方法乾坤之靜取靜以制動之義專治陽極而亢陰衰而躁如產後血虛鬱冒自汗出大便難癰瘕俗名驚風每殞胎必三月溫熱誤下誤汗邪退後陰之所存無幾一切陰虛而陽不損之症薈萃三陰柔藥半用血肉有情嬌動而不呆板之物養陰最速接其生氣而以收藏納縮之少陰爲主蓋陽主開陰主閉故從來治腎以大封大固爲主經云腎爲封藏之本兼淫燥寒三項陰邪之病者禁用

干氏 每殞胎必三月前人謂肝虛而熱用桑寄生湯余前保范氏胎以寄生湯藥品難得又較長莫及改用專翁大生膏純然補陰爲乙癸同源之治遂大生四五胎茲症面青黃脈弦細不惟不熱且虛寒之甚改用天根月窟膏兩補下焦陰陽兼補八脈始大生一胎孩體冰涼不赤未能存活又服藥一年又大生一胎嬰兒仍不甚溫又服藥一年又大生兩胎存活一

男一女矣

產後

癸亥二月 初四日 王氏 二十歲 熱雖重而陰脈有餘非虛證也乃伏暑為病陽陷入陰之

故痰多咳嗽胸痞不飯忌柔藥

炙蠶甲 五錢 茯苓皮 三錢 乾薑 一錢 青蒿 三錢

廣鬱金 三錢 青皮 一錢 半夏 三錢 青橘葉 三錢

生薑 三片 黃皮 一錢 黃芩炭 一錢 煮三盃分三次服

初六日 服剛藥而寒反多熱反少脈反緩而小不渴太陰溼重也

茯苓 五錢 茅朮炭 三錢 青蒿 三錢 半夏 五錢

廣鬱金 二錢 黃皮 二錢 乾薑 三錢 黃芩炭 一錢

生薑 三錢 草果 一錢 煮三盃分三次服

初七日 脈緩舌苔重便溲胸痞色淡黃白合而觀之為溼重脾寒之象

半夏 五錢

茯苓塊 五錢 薏仁 五錢

杏仁 二錢

生茅朮 三錢

炒黃芩 二錢 檳榔 一錢

煨草果 五分

廣皮 二錢

乾薑 三錢 白薤仁 六分

煮三盃分三次服

初八 諸症俱減宜減其製

茯苓 三錢

淡乾薑 一錢 生茅朮 二錢

半夏 三錢

黃芩炭 一錢

檳榔 八分 杏仁 二錢

白薤仁 六分

廣皮 一錢

煮二盃分二次服

初十 病退八九以養中焦爲法

半夏 三錢

茯苓塊 五錢 薏仁 五錢

杏仁 三錢

炒於朮 二錢

蓮子 連皮打碎 廣皮 一錢 五分

白薤仁 研八分

煮三盃分三次服

十三 產後陰傷因有寒濕外感症但見脈緩而陰脈有餘之寒濕滯症故忌柔

用剛茲溼症全愈而陰虛脈洪數陰脈不足之症現則不得不退剛用柔  
因時制宜醫貴乎活潑流動神明變化以求合乎道者此也豈有一毫私  
意存乎其間哉

大生地 四錢

麥冬 四錢 不去心 熟五味 九粒 打碎

焦白芍 六錢

生牡蠣 四錢

炙甘草 二錢 炙鱉甲 三錢

煮三盃分三次服

癸亥五月廿六日 丁氏 八歲 血與水搏產後惡露不行腹堅大拒按神思昏冒其為瘀

血上攻無疑

歸尾 五錢

藏紅花 三錢 川芎 一錢

桃仁 三錢

兩頭尖 三錢

煮三盃分三次服間服化癥回生丹 五丸

廿七日 血化為水瘀滯攻心昨已危急因用回生丹以直入厥陰陰絡之兩頭尖

為嚮導續下瘀滯而神氣已清但瘀滯尚多議以化癥回生丹緩攻為宜

藏紅花 一錢

澤蘭 一錢

兩頭尖 三錢

廣鬱金 三錢

煮兩盃渣再煮一盃分三次服化癥回生丹三九每次和服一九

日八腹中無處不痛服沈數有力瘀血尙多

歸尾五錢 元胡索四錢 澤蘭三錢 桃仁三錢

京三稜三錢 莪朮三錢 紅花二錢 兩頭尖五錢

川芎一錢 煮四盃每盃和化癥回生丹一九服

日廿九瘀滯已去不少腹痛減去八九經謂大毒治病十衰其六卽無毒治病十

衰其九勿使過劑今日頭暈而冒視歧見兩物不可猛浪再與攻瘀議七  
味九加車前子牛膝琥珀一面搗少陰生氣一面宣絡腫之血方爲合拍  
此時生死相關之際不可不精細也

茯苓炒黃四錢 熟地炭八錢 肉桂炒焦三錢 炒澤瀉六錢

黃肉炭三錢 丹皮炒焦四錢 山藥炒黑三錢 車前子四錢

牛膝四錢 其炒炭煮成三碗又加琥珀細末九分分三次沖服



三十同前

六月初一日 瘀血隨衝氣上攻神昏又用

化癥回生丹 五九

初二日 前用攝少陰開太陽法小便稍利腫脹微消但衝氣上動咳而不寐議伐

腎邪以止衝氣和胃以合寐

茯苓塊連皮 八錢 半夏 六錢 紫石英生研細 三錢 桂枝 木 三錢

秫米 一握 製五味 一錢 甘瀾水煮成三盃分三次服

初三日 昨與伐衝氣兼和胃藥已見效仍宗前法腰冷少腹脹加小茴香

猪苓 三錢 茯苓塊連皮 八錢 半夏 八錢 澤瀉 三錢

老厚樸 一錢 秫米 一合 桂枝 三錢 小茴香炒炭一錢五分

甘瀾水煮成三盃分三次服

初五日 脈漸小為病退左關獨大為肝旺夜間氣上衝胸溺陰隨肝陽上升之故

產後陰虛不敢峻攻食少宜開太陽藥與和胃

茯苓塊

五錢

桂枝

三錢

小枳實

一錢

旋覆花

包三錢

澤瀉

三錢

五味子

一錢

焦白芍

三錢

半夏

六錢

廣皮炭

一錢五分

廣鬱金

一錢五分

澤蘭

一錢五分

煮三盃分三次服

初七日

諸症悉除惟餘痰飲咳嗽喘滿短氣胸痺皆係應有之症無足怪者經謂

病痰飲者冬夏難治況十數年之痼疾又屈產後乎

桂枝

五錢

姜半夏

六錢

厚樸

二錢

桂心

沖三錢

生薏仁

五錢

薤白

一錢五分

猪苓

三錢

茯苓塊

五錢

廣皮

二錢

澤瀉

三錢

煮三大盃分三次服

王氏

鬱冒自汗出大便難產後三大症俱備因血虛極而身熱發厥六脈散

大俗云產後驚風不知皆內症也斷斷不可誤認外感症議翁持真陰法

大生地

六錢

麥冬

不去心

白芍

二錢

生薑

五錢

阿膠 三錢

五味子

製一錢

生牡蠣

三錢

鮑魚

三錢

炙甘草 一錢

去渣後攪入

雞子黃

二枚

海參

二條

煮三否分三次服

又

夜間汗多加龍骨

五錢

又

產後鬱冒自汗出六日不大便血少而淡一以增津補液為主

元參 五錢

大生地

六錢

洋參 一錢

麻仁

五錢

炒白芍 三錢

鱧魚

四錢

麥冬

不去心

生龜版

三錢

海參 三條

阿膠 三錢

五味子

五分

炙甘草

五分

白蜜 一酒

煮三大盞分三次服

見大便去元參

又

於前方內去洋參甘草

乙丑四月廿四日

文氏

太陰濕土司天之年六脈沈細而緩舌苔滿佈白滑得飲則

胸滿大便澀泄面青黃唇白身萎不起顯係寒淫所傷致脾胃兩陽大敗

法以通補將陽使寒淫得行方妙豈有損補中焦守補臟真之理皆因其產後而誤也

生茅朮 三錢 半夏 五錢 小枳實 三錢 猪苓 三錢

茯苓 連皮 五錢 煨草果 一錢 生薏仁 五錢 澤瀉 三錢

廣木香 一錢 老厚樸 三錢 廣皮 一錢 甘潤水煮三盃分三次服

廿五日 產後中淫昨用剛標通陽藥已見效今日細詢鼻出涼氣腸鳴腹痛背惡

寒香酸皆表裏陽虛見症餘詳前案

姜半夏 三錢 桂枝 三錢 小枳實 一錢 生薏仁 五錢

乾姜 三錢 煨草果 一錢 老厚樸 三錢 椒目 三錢

廣橘皮 三錢 生茅朮 三錢 煮三盃分三次服

廿六 六脈陽微之極稍緩則難救矣即於前方內加

桂枝 二錢 煨草果 五錢 吳萸 二錢 夏姜 一錢

生茅朮 二錢 乾姜 二錢

廿七日 產後中淫大用苦辛剛燥已見大效古法效者減其製但夜間不寐非重

用半夏不可宗素問也

半夏 一兩二錢 茯苓皮 五錢 乾姜 三錢 椒目 五錢

生茅朮 五錢 秫米 一合 草果 二錢五分 生薏仁 五錢

甘瀾水煮三盃分三次服

廿八日 吞酸不得寐照前方內加

半夏 八錢 淡吳茱萸 五錢 秫米 一合

廿九日 前因得效而減其製但與和胃令寐今雖得寐而舊症復來仍與廿六日

方再服一帖

三十日 產後中淫昨日復行大用剛燥又見大效今日仍減其製

茯苓塊 五錢 半夏 八錢 椒目 三錢 生茅朮 三錢

桂枝 三錢

乾姜 三錢

老厚樸 三錢

薏仁 三錢

廣皮 二錢

小枳實 一錢五分

煎法服法如前

五月初一日

昨日減製病便不大效今日於前方內加

薏仁 二錢

生茅朮 二錢

乾姜 二錢

草果 一錢五分

初二日

諸症悉減惟口不知味不能起坐脈微陽未復也用真武湯法

熟附子 三錢

桂枝 五錢

生白朮 三錢

生茅朮 五錢

椒目 五錢

煨草果 一錢五分  
茯苓塊 五錢

生薑 五片

生薏仁 五錢

煮三盃分三次服

初三日

於前方內加乾姜 三錢

附子 五錢

真姜 三錢

去白朮

初四日

又於前方內加厚樸 三錢

枳實 三錢

廣皮 三錢

初六日

微惡寒右脈未起陽不復也

桂枝 六錢

熟附子 四錢

乾姜 二錢

茅朮 三錢

吳氏醫案



後

吉

茯苓塊 三錢  
生薑 五片  
薏仁 五錢  
小枳實 二錢

煮三盃分三次服

初八 諸症悉減脈滑不寐胃不和也與素問半夏湯

茯苓 三錢  
姜半夏 八錢  
秫米 一合  
薏仁 五錢

杏仁泥 三錢  
煮三盃分三次服

初九 仍不寐加半夏至成兩半寐則不必加

初十 溫毒頰腫喉痛牙床木痛與普濟消毒飲但久病大虛初愈藥不宜過重

耳

元參 二錢  
苦桔梗 一錢  
射干 一錢  
銀花 一錢

牛蒡子 一錢  
芥穗 八分  
連翹 一錢  
人中黃 八分

僵蠶 一錢  
薄荷 五分  
茶菊花 一錢  
馬勃 八分

午刻一帖申刻一帖戌刻不見重明早服一帖若口邊身痛腫甚戌刻加一帖

十一 照初十日方服三帖

日 再服三帖 外洗目方 赤爛風弦脾經溼熱他症不可用此方也

桑葉 三錢 薄荷 一錢 明礬 六分 連翹 三錢

枳殼 二錢 應鑿 三分

先煎四味草藥去渣後入二礬上火化令相得先煎後洗洗後勿令見風

十三 病減者減其製

銀花 一錢 青箱子 一錢 茶菊花 一錢 連翹 一錢

苦桔梗 八分 冬桑葉 八分 薄荷 三分 牛蒡子 一錢

生甘草 五分 射干 八分 煮二盞分二次服

十四 諸症悉減餘熱未除大勢可無虞矣

苦桔梗 一錢 銀花 一錢 冬桑葉 一錢 草決明 一錢



連翹 一錢

黃芩炭 五分

茶菊花 一錢

兒茶 八分

生甘草 一錢

煮三盞分二次服今晚一帖明早一帖

日十五

於前方內加刺蒺藜 八分

日十六

於前方內加草決明

黃芩

日十七

諸症悉平惟餘肝鬱仍宜兩利肝胃兼宣絡脈

降香末 三錢

青皮 一錢

生薏仁 五錢

旋覆花 包三錢

香附 三錢

廣木香 一錢

製半夏 六錢

廣皮 二錢

益智仁 一錢

煮三盞分三次服

日二十

進食不旺且與和胃

茯苓塊 三錢

半夏 五錢

白薏仁 一錢

藿香梗 三錢

生薏仁 五錢

廣鬱金 二錢

益智仁 一錢

廣皮 炒黑三錢

大麥芽 一錢

煮三盞分三次服

日廿一下焦濁陰因寒淫蟠踞且來上攻心胸若痞舌白滑濁議調飲法

川椒三錢 淡吳萸三錢 厚樸三錢 良姜三錢

小茴香三錢 廣皮二錢 青皮二錢 小枳實三錢

煮三盃分三次服

藥服後如腹痛不止可服天台烏藥散一錢不知服二錢

日廿二昨晚泄瀉一次今日痛減仍不知味

茯苓塊三錢 澤瀉二錢 熟附子三錢 生茅朮三錢

廣皮二錢 老厚樸二錢 淡吳萸三錢 生薑三片

益智仁一錢五分 生薑仁三錢 煮三盃分三次服

日廿三腹中水氣仍然未盡

茯苓塊五錢 半夏五錢 生茅朮三錢 生薑仁五錢

乾姜三錢 小枳實三錢 老厚樸三錢 生薑五片

益智仁 二錢

甘瀾水頭煎兩盃二煎一盃分三次服

廿五

舌色漸正是其佳處大便溏滑滯正行而未盡也責在脾不和

不和也

半夏 一兩

茯苓塊 六錢 薏仁 五錢

猪苓 三錢

生茅朮 五錢

乾姜 三錢 澤瀉 三錢

益智仁 三錢

糯米 二台

桂枝 三錢

甘瀾水八碗煮取三碗分三次服一日一帖令盡

廿八

下焦濁陰上攻心悸即衝疝奔豚之類也議桂枝加桂法

茯苓 五錢

熟附子 三錢 全歸 三錢

桂枝 五錢

焦白芍 二錢

川芎 一錢 川椒 炒黑 三錢

小茴香 炒黑 三錢

生薑 三片

肉桂 去粗皮研 細汁三錢

煮三盃分三次服

廿九

脾陽幾無非再與重切脾陰不可

茯苓塊 五錢

桂枝 三錢

生薑仁 五錢

生茅虎 五錢

肉桂 錢五

黑川椒 三錢

廣皮 二錢

煨草果 一錢

煮三益分三次服

六月初一日 於前方內加附子 二錢 乾全蝎 二個 煨草果 五分 肉桂 五分

初二日 肝鬱脇痛久必成肝著速速開朗情志要緊以痛止為度

新絳紗 三錢

半夏 三錢

生香附 三錢

蠲勝 一錢

旋覆花 包三錢

廣鬱金 二錢

降香末 三錢

蘇子霜 三錢

高良姜 二錢

煮三益分三次服

利八日 肝鬱則脇痛寒溼則腹痛

淡吳茱 三錢

良姜 二錢

生香附 三錢

旋覆花 包三錢

青皮 二錢

廣鬱金 二錢

降香末 三錢

煮三益分三次服

吳氏醫案

產後

七

初九 久病脾胃兩虛切戒大飽大饒現在不寐

半夏 一兩

藿香梗 三錢

益智仁 煨一錢 五升 秫米 一合

廣鬱金 三錢

甘湖水煮三盃分三次服以得寐為度

十一 諸證悉減惟餘舌白滑脇下痠痛

半夏 五錢

降香末 三錢

生香附 三錢

青皮 二錢

生薑仁 三錢

廣鬱金 二錢

歸頭 二錢

白烏藥 二錢

元胡索 二錢

更姜 二錢

煮三盃分三次服

十四 脾氣久虛未復調理飲食要緊防成痼疾在暑月雖常人之脾必虛況久

病平

半夏 五錢

茯苓塊 三錢

厚樸 三錢

更姜 二錢

廣木香 一錢

香附 三錢

烏藥 二錢

益智仁 一錢

椒目 二錢

青皮 二錢

煮三盃分三次服

十六 寒溼未淨復受暑濕誤開太陽因陽明法

桂枝 五錢 茯苓 五錢 薏仁 五錢 半夏 六錢

生茅朮 三錢 椒目 五錢 安桂 二錢 肉果霜 三錢 去淨油

乾姜 二錢 猪苓 五錢 益智仁 一錢 廣皮 三錢

澤瀉 五錢 煮四孟分早中晚夜四次服

十八 客氣加臨之溫病已退舌苔白滑寒溼傷陽之本病復舉先與利陽明之

陽以為坐鎮中州之計微泄厥陰之陰斯乃撥亂反正之規

茯苓塊 三錢 生薏仁 五錢 淡乾姜 二錢 製半夏 四錢

吳萸 二錢 泡淡 益智仁 一錢 生茅朮 三錢 川椒 二錢 炒黑

煮三孟分三次服

十九 今日腹痛

茯苓 三錢 半夏 三錢 藿香梗 二錢 生薏仁 五錢

吳氏醫案

產役

夫

夏姜 二錢

廣藿金 二錢

淡吳萸 三錢

厚樸 三錢

炒乾姜 一錢

小茴香 三錢

廣皮 一錢五分

煮三盞分三次服

日廿一

面色猶然暗淡青黃舌苔刮白時退時復大便或泄或不泄得油膩則滑

甚四末時或一冷則其脾陽未能一時全復可知仍以醒脾利溼立法

生茅朮 四錢

半夏 三錢

川桂枝 三錢

茯苓塊 連皮 三錢

肉桂 一錢 去粗皮

廣藿金 二錢

生薏仁 三錢

椒目 三錢

生益智 二錢

大豆卷 三錢

神麴 二錢

廣皮炭 二錢

煮三盞分三次服

日廿五

暑溼傷氣腹中按之微痛善惡者肺氣虛也補之以辛

蒼朮炭 三錢

半夏 三錢

老厚樸 二錢

茯苓塊 三錢

厚姜 一錢

生益智 一錢五分

生薏仁 五錢

乾姜 一錢五分

廣皮炭 一錢五分

川椒炭 二錢

煮三盞分三次服

初六日 鼻尖涼與胸中涼風上升者皆脾陽久困一時不能復脾之象口舌淡

稍減思飲是其佳處

生茅朮 八錢

桂枝 五錢

熟附子 三錢

茯苓塊 五錢

神麴 三錢

小枳實 三錢

生薏仁 五錢

廣皮 三錢

張益智 三錢

煮三盃分三次服

初四

諸證悉減惟餘便澀腹痛口已渴且減大熱純剛暫與分利

薏仁 五錢

生茅朮 八錢

椒目 三錢

猪苓 三錢

廣木香 一錢五分

神麴 二錢

澤瀉 三錢

益智仁 一錢五分

廣皮 一錢五分

煮三盃分三次服

初六

泄瀉已止惟食後欠安

生茅朮 三錢

半夏 三錢

廣鬱金 二錢

老厚樸 二錢

青皮 一錢

焦神麴 二錢

生薏仁 三錢

廣皮 一錢五分

吳氏醫案

產後

九



益智仁一錢

裝吳茱二錢

煮三盃分三次服

十一諸証悉除惟餘晨泄由脾虛及腎寒議理下焦

桂枝三錢

生茅朮三錢

蓮子三錢

茯苓三錢

肉果霜三錢

芡實三錢

半夏三錢

大豆卷二錢

生姜三片

枳實三錢

煮三盃分三次服

廿七瀉泄雖止但終夜不寐胃尚未和也專與和胃

半夏二兩

生薏仁一兩

秫米一合

甘湖水八碗煮取三碗渣再煮一碗分四次服

周氏三十歲產後子腸不收突出戶外如小西瓜大一塊但軟扁耳脈弦數氣血

皆虛着重在氣先以吳茱細末作袋墊身下湯藥以補中益氣湯少加川

芎八分一帖而收二帖去川芎三帖去升柴加桂固經月而安

百氏二十歲產後鬱冒一日厥去四五次先與定風球卽復脈湯去姜桂大棗加

經版龜甲牡蠣海參鮑魚鷄子黃一帖而效服至七日大安於是作專翕  
大生膏一料全壯

呂氏二十歲產後腰痛不可忍八脈虛而受寒

桂枝 三錢

安邊桂 二錢 杏仁 三錢

鹿茸 三錢

鹿角霜 三錢

炒杜仲 三錢 蒼朮 三錢

枸杞子 炒三錢

牛膝 二錢

煮三盞分三次服服十餘帖而大安

秀氏三十歲產後不寐脈弦喘咳與靈樞半夏湯先用半夏一兩不應次服一二兩  
得熟寐又減至一兩仍不寐又加至二兩又得寐又減又不得寐於是竟  
用二兩服七八帖後以外臺茯苓飲收功

丁亥四月某氏三十歲產後感受風溫自汗身熱七八日不解現在脈沈數邪陷

下焦瘧瘧谷云產後驚風與復脈法但須先輕後重

細生地 四錢

麥冬 四錢 不去心 火麻仁 二錢

生白芍 二錢

丹皮 三錢

炙甘草 一錢 生薑 五錢 打碎

阿膠 二錢

煮三盃分三次服

十四 產後陰虛又感風濕身熱與復脈法身熱已退但脈仍數虛未能復仍示

前法而進之

丹參 三錢

大生地 五錢 生牡蠣 五錢

炒白芍 三錢

生薑 五錢

麻仁 三錢 麥冬 三錢 不去心

炙甘草 二錢

丹皮 三錢

阿膠 三錢

濃煎三茶盃分三次服

辛卯七月 廿七日 晉氏 二十歲 產前暑傷肺衛身大熱三日而生產後十五日熱不解並

前三日已十八日矣逆傳心包神呆癰癰全入心營大便結六脈洪虛症

已探危勉與邪少虛多之復脈湯法兼以清上

細生地 五錢

元參 四錢

紫菊花 三錢

焦白芍 三錢

麥冬 四錢 不去心

冬桑葉 三錢

火麻仁 四錢

丹皮 三錢

炙甘草 三錢 生薑 五錢 阿膠 三錢

煮三盃分三次服 外服牛黃清心丸 一九

八月初九日 產後伏暑痧症與復脈法已愈惟大便結脛虛不可以下只有尋法可

行湯藥潤津液為要

元參 一兩 大生地 五錢 阿膠 五錢 麥冬 五錢 不去心

生白芍 三錢 麻仁 五錢 煮三盃分三次服 此方服三帖大便通

十二日 產後陰虛

大生地 六錢 沙參 三錢 火麻仁 三錢 生阿膠 三錢

麥冬 四錢 不去心 炙甘草 三錢 炙阿膠 三錢 歸身 二錢

桂圓肉 三錢 生白芍 三錢 萸肉 三錢 煮三盃分三次服

陰吹

英氏 三十歲 陰吹按金匱婦人門之陰吹治以猪膏髮煎純然補陰注謂腸胃俱

吳氏醫案

陰吹

三

稿再按腸胃俱稿陰不足者陽必有餘脈當數面與唇舌皆赤口當渴茲面青脈弦而遲不食不饑不便不寐蓋痰飲蟄踞胃中津液不行大腸腸雖稿而胃不稿議通幽門法

半夏 一兩

桂枝 六錢

廣皮 五錢

枳實 八錢

煮三盃分三次服服一帖而減三帖而退惟餘痰飲調理脾胃數月而痰飲亦愈

黃氏 四十 痰飲誤補喘而脈洪汗出先與大青龍去麻辛而安半月後又因感受燥金之氣兼之怒鬱傷肝脈弦緊身熱腹痛先與柴胡桂枝各半湯熱退而腹痛未愈且泄瀉陰吹焉得腸稿用川椒吳黃夏姜丁香各五苓散而陰吹愈後調理痰飲一月而安

李氏 七十 臍左有塊痛少腹亦痛大便自調陰吹亦非腸稿與化癥回生丹而愈

交腸

穆氏 前陰出糞病名交腸溼熱之故以其人喜飲黃酒大食猪肉之所致也  
與五苓散法五苓散加黃柏黃連龍膽草數帖而愈告以切戒猪肉黃酒  
伊遵戒半年飲食精神大好已復元矣八月節開肉後又開酒病復發不  
可爲矣

調經

楊室女二十歲經停一年腹有癥瘕寒熱往來食少肝陽鬱勃下陷木來克土先  
與提少陽生發之氣

姜半夏

五錢

桂枝

三錢

全當歸

二錢

焦白芍

三錢

青蒿

一錢

白薏仁

二錢

生薏仁

五錢

廣皮

二錢

黃芩炭

二錢

煮三益分

三次服服

三四帖而寒熱盡退

再與天台烏藥散每日早晚各服一錢驅臟中之濁陰卽所以通下焦

之陽氣不惟通下焦之陽亦且大通胃陽胃陽得開而健食健食而生血所謂受氣謂穀取汁取胃變化而赤是爲血此血也心主之脾統之肝藏之由肝下注衝脈在男子上潮於唇生鬚髮在女子下泄爲經故此方服二十餘日而瘕散經通矣蓋巴豆多用則殺人少用則和胃此方中用巴豆之氣而不用其質少之又少既能祛下焦之濁陰又能通胃中之真陽以胃雖受濁而最惡濁驅陰正所以護陽通陽正所以驅濁一筆文字而兩面俱醒此其所以見效若神也伏暑門中醫王氏之方亦同此義

乙酉八月十九日 余氏二十無端半產與暴崩六脈沈軟而細如伏陽虛體質產後漏

經半年經止後一年有餘忽來如崩又疑半產一以溫經爲要

去渣投 阿膠 四錢 小茴香 炒炭 四錢 乾姜炭 三錢 艾炭 四錢

全當歸 二錢 炙甘草 二錢 煮兩大茶盞分二次服

日三

經停年餘始行故多若暴崩脈沈細若伏少腹痛甚故用膠艾湯溫經  
久感受燥金寒溼面腫胸痛而泄少腹痛拒按舌上白苔滿佈仍與溫法  
去守補之阿膠甘草

艾葉炭 五錢

炮姜 五錢

小茴香 炒炭 三錢

姜半夏 五錢

雲苔 五錢

淡吳萸 三錢

生薏仁 五錢

全歸 二錢

川椒炭 三錢

降香末 三錢

煮三盃分三次服

日七

經色全然不赤面腫已消似當用補但六脈滑甚舌苔較前雖薄仍然純  
白腹中按之則脹少腹仍痛溼邪之歸下焦者未消仍與溫經行溼

艾葉炭 五錢

薏仁 五錢

車前子 五錢

姜半夏 五錢

白通草 一錢

炮姜 三錢

大腹皮 三錢

雲苓皮 五錢

厚樸 二錢

小茴香 炒炭 三錢

廣皮 二錢

益母草 二錢

煮三盃分三次服

九月初一日

停經一年有餘經通後舌白滑五日前面腫腹痛帶下特甚其為帶脈



之寒溼下注無疑

艾葉炭 五錢

薏仁 五錢

車前子 三錢

小茴香 炒炭 五錢

草薢 五錢

白通草 一錢

姜半夏 三錢

全歸 三錢

益母膏 二錢

大腹皮 三錢

炮姜 三錢

煮三盃分三次服

十六怪多成五泄兼之口糜與五苓散法加薏仁木通

猪苓 五錢

雲苓皮 五錢

桂枝 一錢

澤瀉 五錢

蒼朮炭 一錢

不通 二錢

薏仁 五錢

煮三盃分三次服

服二帖全愈

十一月十四日帶症已久不時發經不調六脈陽微之極皆產後受傷虛不肯復之

故治在八脈非通補奇經丸不可且與湯劑行溼而溫經體厚脈細易腫

者溼多此方不妨多服

雲苓皮 六錢

全歸 三錢

紫石英 三錢

川草薢 六錢

艾葉炭 三錢

蓮子 法心連 皮五錢

炒杞子 三錢

小茴香 三錢

芡實 五錢

煮三盃分三次服

通補奇經丸方 補下本係入腰虛寒之病久帶則下焦愈虛古人所以有洞  
厄之愈也一以通補八脈為要此證陽虛兼溼一用熟地黃肉桂桑之品  
斷無生理

鹿角膠 四兩

鹿茸 八兩

沙蒺藜 四兩

肉苁蓉 六兩

小茴香 六兩

人參 四兩

補骨脂 四兩

川萆薢 六兩

當歸 六兩

炙龜版 四兩

鹿賊骨 四兩

桑螵蛸 六兩

生牡蠣 六兩

杜仲炭 二兩

紫石英 二兩

枸杞子 四兩

右為細末益母膏和丸如小梧子大每服三錢早晚各

服一次不知午刻加一次暫戒豬肉永戒生冷若不能戒不必服藥間

服靈丹四五十丸

丙戌正月 初六日

大凡胞宮累及陽明者治在胞宮陽明累及胞宮者治在陽明此症

兼而有之病起連後漏經半年胞宮之損可知體厚溼重易腫總食不旺  
陽明之虛又可知矣當兼治之 每日空心服奇經丸三錢以補胞宮

午間晚間各服湯藥一椀湯藥以理陽明為主

葵半夏 六錢

雲苓 六錢

益智仁 三錢

川草薢 六錢

廣皮 四錢

川椒炭 三錢

生薏仁 八錢

生薑 三錢

水八椀煮取兩椀午服一椀臨臥服一椀納食漸旺形體稍瘦則不必服食減不瘦則再服

丁亥二月十二日

阮氏三十七歲

六脈俱細左兼弦緊下焦虛寒八脈不固陽氣不攝之病

豈純陰所能靜守雖暫用固澁不旋踵而仍復崩潰古謂初崩宜溫現在且用溫經將來非峻補八脈不可以兼有帶症故也

鹿角霜 五錢

艾炭 三錢

小茴香

黃酒炒

真阿膠 四錢

全歸 二錢

荳蔻炭 三錢

煮二盃分二次服二帖

十四日

金匱謂服雙弦者寒也又謂大則為虛弦則為減女子半產漏下主以小建中其意蓋以中焦陽氣為要令營衛調和胃旺自能生血前以崩漏而

用溫下焦之陽現在雖止脈仍弦緊陽未復也況又自汗納食不旺今日仍宗前法兼與建中以衛陽虛故也

鹿角霜 三錢

桂枝 二錢

黑杞子 二錢

焦白芍 四錢

全歸 三錢

眞阿膠 二錢

艾炭 二錢

炙甘草 一錢

<sup>解</sup>小茴香 三錢

川萆薢 三錢

煮三盃分三次服服此方四肢畏寒解納食旺

日十六崩帶脈弦左手更緊四肢畏寒納食不旺皆誤用陰藥之故昨與溫補下

焦兼用建中調中焦現在四肢畏寒解納食稍旺左脈之緊亦解崩止而精未除與通補八脈法

鹿角霜 五錢

萆薢 四錢

小茴香 三錢

雲苓塊 三錢

全歸 三錢

紫石英 三錢

<sup>生研細</sup>炙龜版 四錢

杞子 三錢

生薑炭 一錢

煮三盃分三次服

日十九於前方內去生薑炭加桑螵蛸 三錢

廿二 止而精未除於前方內加 人參 海螵蛸 鮑魚

廿三 八脈虛寒脈弦緊與通補奇經丸

鹿角膠 四兩 黃鹿茸 十二兩 小茴香 六兩 鹿角霜 四兩

雲苓 大兩 補骨脂 六兩 生牡蠣 六兩 杞子 六兩

肉苁蓉 四兩 炙龜版 八兩 藜蘆 六兩 苑絲子 四兩

高麗參 四兩 全歸 六兩 紫石英 生明水 飛西兩

右爲細末老雀九如小梧子大每服二錢日三服若服三錢早晚各一次

丁亥閏五月初四日 池氏前因中下焦有寒服霍亂散已效惟月事總不應期經云二陽之病發心脾女子不月二陽者陽明也陽明陽氣受傷肝來克土故常吐白沫胃虛而肝乘之故時發嘔逆現在受病確與經文相合議與利胃養胃和則不嘔肝不來克納食旺自然生血經所謂中焦受氣取汁變化而

赤是爲血又謂瘀出中焦陽氣充滿則血無阻滯此等調經法世人絕不知之

姜半夏 五錢  
薏仁 五錢  
生香附 三錢  
雲苓培 二錢

廣皮 三錢  
降香末 三錢  
生薑 五大片

煮成三盃分三次服以至不嘔不吐沫納食旺爲度

帶下

李氏三十歲久帶甚至流入跗踵可爲狂帶矣脈弦數下焦陰陽八脈皆虛與天

根月窟膏每日一兩分早中晚三次服服至百日外面愈

戊子二月初十日 達女 十七 初因內傷生冷又加伏暑中之溼熱去冬寒熱頻仍可知

以致經閉淋帶腹痛等症現在食太少大便溼瀉先與和脾經謂二陽之病發心脾女子不月應從此處入手近世罕知之再補土者必先行瀉土惡溼故也

姜半夏 五錢

薏仁 五錢

川椒炭 二錢

雪苓塊 五錢

草薢 五錢

白蔻仁 一錢 益智仁 二錢

廣皮 二錢

煮三盃分三次服

十三 照前方再服三帖

十七 瘕氣繞臍痛少腹亦時痛

天台烏藥散 二兩 每服一錢分早中晚夜四次服淡姜湯和如痛甚服

二錢服二三日再商

廿一 腹痛已減胃亦漸開脈仍弦數肢倦與宣肝絡之中兼兩和用胃

新絳紗 三錢

歸鬚 二錢

姜半夏 五錢

欒金 二錢

旋覆花 包三錢

降香末 三錢 雪苓塊 五錢

廣皮 三錢

益智仁 三錢

生薑仁 五錢

煮三盃分三次服 每日空心服天台

烏藥散五六分 此方服十二帖胃漸開腹痛止肢倦減面色稍紅

陰燥

陳室女十五歲

脈弦數時時欲哭每日哭四五次動生一時又哭無故而然每逢經後更甚此行經太早陽氣燥也與金匱甘麥大棗湯以潤之服十數劑漸愈後服專翕大生膏四劑全安

痘症 庚申十月起

周女一週零一月

身熱耳冷隱隱有點防痘夏令感溫暑而發先宜辛涼解肌令其易出切忌辛溫發表致表虛發癰潰爛且助溫熱

連翹 三錢

苦桔梗 三錢 甘草 一錢

炒銀花 三錢

荆芥穗 八分

蘆根 三錢

薄荷 八分

三朝

點出未透仍宜解肌

照前方

三朝

陰痘三天業已出齊但頂陷色暗與活血提頂法再包白皮溲兩太陰素虛之體此痘若用羌防必致癰塌一進苦降必致泄瀉

吳氏醫案

陰燥 痘症

三



全歸土炒二錢

苦桔梗一錢五分 木通二錢

炒銀花三錢

黃芩炭一錢五分

白芷二錢 連翹二錢

焦白芍一錢五分

紫草八分

羅犀角一錢 南查炭一錢

四朝

氣虛則根鬆頂陷血熱則色淡無歡毒重則攢簇且與清毒活血提頂

扶過七日能用稍托方可有成不然九朝漏瀝可慮況現在泄瀉

全歸土炒二錢

苦桔梗二錢 白芷二錢

羅犀角三錢

羚羊角三錢

紫草一錢五分 連翹三錢

炒銀花三錢

紅花一錢

皂針一錢 生甘草一錢五分

公雞冠血每大半黃酒盃點入三小匙

五朝

痘五天牛氣虛不能載毒外出牽延時日必致內陷塌瀝今日仍然外

感用事未敢大補亦須用托法

棉蓂生三錢

白歸身三錢 白芷二錢

連翹一錢五分

苦桔梗二錢

皂針一錢五分 丹皮二錢

燕窩根五錢

紫草 一錢

甘草 五分

雞冠血 三五

濃煎一茶盃服完渣再濃煮半盃明早服

六朝 六天少用補托藥已起脹顏色頗鮮但皮薄殼亮今日須大補明日須

峻補

黨參 三錢

生黃耆 五錢

白歸身 三錢

白芷 二錢

苦桔梗 三錢

炙甘草 一錢

紫草 二錢

燕窩根 一兩

廣皮炭 一錢

川芎 一錢

雞冠血 每

一酒

公雞湯煎藥

七朝 兩用補托色鮮而潤陷者復起但青紫十之二三殼亮頗多今到七日

臟腑已週氣血用事正好施補氣斂毒之方

人參 一錢

生黃耆 五錢

廣木香 八分

白芷 一錢

苦桔梗 三錢

炙甘草 二錢

川芎 四分

煨肉果 一錢

燕窩根 一兩

廣皮 一錢

公雞湯煎

八朝 入天痘頂圓綻者不過一二頭面行漿胸背清漿三四四肢全然空殼

根盤色淡此氣血兩虛急宜峻補用參歸鹿茸台陳氏異功法

生黃耆 一兩

黃鹿茸 二錢

煨肉果 二錢

茯苓塊 三錢

人參 一錢

廣木香 一錢

苦桔梗 三錢

歸身 六錢

炙甘草 三錢

廣皮炭 二錢

白芷 三錢

燕窩根 一兩

公雞湯 一椀

右藥煮成四茶盃加鹿茸汁半茶盃雞湯一中椀燕窩

湯一椀和勻上火煨濃小人服一半大人服一半

九朝 九天昨用峻補兩臂雖有黃漿四肢仍然空殼泄瀉之故用陳文仲大

異功散

生黃耆 一兩

人參 一錢

煨訶子 三錢

茯苓塊 六錢

肉桂 末一錢

去粗皮爲

廣木香 二錢

鹿茸尖 六錢

酒煎

炒於朮 五錢

煨肉果 三錢

廣皮炭 二錢

歸身 五錢

土炒

炙甘草 三錢

十朝

即於前方內去肉桂鹿茸尖歸身加

生黃耆 四錢

澤瀉 五錢

十一朝

照前方

十二朝

即於前方內加薏仁 五錢

十三朝

漿未十分滿足四肢間有破損難保無痘毒咳嗽等事茲用利水以助  
結痂驅逐餘毒即在其中所謂一舉而兩得者也

茯苓塊 五錢

洋參 三錢

廣木香 一錢

焦於朮 三錢

薏仁 八錢

煨訶子 二錢

煨肉果 一錢

澤瀉 三錢

炙甘草 一錢

廣皮炭 一錢

十四朝

脚腫胸悶洩短水不利也

茯苓塊 五錢

冬朮 三錢

炒銀花 二錢

生薏仁 五錢

連翹 二錢

廣皮炭 一錢

飛滑石 一錢

澤瀉 二錢

五穀蟲 一錢

五分

吳氏醫案

痘症

三

九月初四日 何男 三天氣虛毒重粘連成片兼之色滯頂陷攻毒則得虛溫托則

碍毒兩難措手和中安表更不濟事勉與活血提毒不犯中下二焦

烏犀角 五錢 連翹 三錢 全當歸 三錢 羚羊角 三錢

紫草 三錢 南查炭 三錢 苦桔梗 三錢 白芷 一錢

直天蟲 二錢 粉丹皮 三錢 薄荷 一錢 生甘草 一錢

每一酒杯和豬尾膏三小匙

初五日 四天昨用活血解毒大有起色但喉聲微啞面目浮腫太甚唇色絳紅時

病之火毒太重今日猶宜解毒

犀犀角 六錢 羚羊角 三錢 紫草 三錢 連翹 三錢

苦桔梗 六錢 白芷 一錢 丹皮 三錢 穀精草 三錢

炒蒼肉 二錢 全歸 二錢 赤黃連 一錢 天蟲 三錢

桃仁 一錢 八中黃 三錢

五分

用銀花 五錢 紫花地丁 五錢 煎湯代水

初六 五天半漸有起色但險症變幻不一時刻小心爲要今日仍宜活血提頂

微加托裏

犀角 三錢 生棉著 三錢 紫草 三錢 銀花 三錢

穀精草 三錢 白芷 二錢 連翹 三錢 土全歸 三錢

皂針 一錢 紅花 三分 炙甘草 五分

雞冠血 每一酒盞藥

初七 六天半時癰已退氣血用事頭面清燥三四迴身亮殼非重用溫托不可

看守不懈不致破損可望成功

生綿著 八錢 黨參 三錢 炙甘草 三錢 白歸身 三錢

紫草 二錢 燕窩根 五錢 廣木香 五分 白芷 二錢

雞冠血 每杯沖 十二時服二帖

初八 七天半漿未及半咬牙寒戰灰白場陷非陳文仲大異功散不可

綿薑 八錢

茯苓塊 二錢 白芷 三錢

人參 一錢 五分

焦於朮 三錢

廣皮 一錢 五分 桂心 一錢 五分

廣木香 二錢

糯米 一撮

鮮身 四錢

炙甘草 三錢

公雞湯煎

初九 八天半昨用大異功法咬牙寒戰已去大半但煩猶未足用異功合參歸

鹿茸法

綿黃耆 一兩

人參 三錢

訶子肉 二錢

黃鹿茸片 五錢

肉桂 二錢 去粗皮

煨肉果 二錢 茯苓塊 三錢

全歸 三錢

廣皮炭 二錢

焦於朮 三錢 白芷 二錢

炙甘草 一錢 五分

廣木香 二錢

濃煎

初十 九天半咬牙寒戰已去十分之九但身上清漿脛足未灌泄瀉頻仍翁仲

仁有泄瀉安寧土虛少毒之論今日猶宜峻補如泄瀉不止再加瀉腸

綿黃耆 一兩

人參 三錢

訶子肉 三錢

生鹿茸 五錢

厚樸 二錢

廣木香 一錢

上肉桂 二錢

白芷 二錢

炙甘草 二錢

煨肉果 三錢

廣皮 一錢

十一 十天半月與功得效但泄瀉未止病癰聚解必有餘毒今日仍可補托一

天議於明日用實脾利水收痼法俾不盡之熱毒從小便而去

綿黃耆 一兩

人參 二錢

廣木香 二錢

上桂肉 一錢

厚樸 二錢

煨肉果 三錢

訶子肉 三錢

炙甘草 三錢

廣皮炭 二錢

十一 一天半痼雖結而聚薄泄瀉以實脾利水為法仍兼滋腸

炙黃耆 五錢

人參 八分

廣木香 二錢

生薏仁 三錢

肉桂 一錢

訶子肉 三錢

焦於朮 三錢

厚樸 二錢

廣皮炭 二錢

茯苓塊 三錢

肉果 三錢

炙甘草 一錢



十三 十二天癰微嗽癰癰便溏仍當補氣兼與實脾

生黃耆 五錢 人參 八分 訶子肉 二錢 茯苓塊 五錢

肉果 煨一錢 廣皮炭 一錢 焦於朮 三錢 薏仁 五錢

炙甘草 三錢 廣木香 一錢 厚樸 二錢

十四 十三天喉啞咳嗽而渴肺中餘毒宜清便溏短痘後脾虛宜實

茯苓塊 三錢 銀花 二錢 訶子肉 二錢 炒冬朮 三錢

連翹 一錢 地骨皮 二錢 苦桔梗 三錢 厚樸 一錢

五穀蟲 一錢 生薏仁 五錢

已酉九月 二十日 何女 歲 險中痘痘三天紫紅扁滿成片不起翁仲仁謂毒重恐過其

形退縮且煩躁肢冷唇焦舌黃瘦短腹痛痘頂先出者已焦勉用雙解法

芥穗 三錢 生大黃 五錢 查肉 三錢 銀花 三錢

苦桔梗 三錢 桃仁 二錢 連翹 一錢 牛蒡子 三錢

薄荷 一錢

全歸 三錢

猪尾膏 三匙

甘草 生一錢

廿四 天鵝紅扁潤下後稍見起發究不胞綻何能起脹成漿咳嗽痰多且臭

清涼敗毒活血懸肌開提肺氣

犀角 三錢

羚羊角 三錢

紫草 二錢

銀花 三錢

苦桔梗 五錢

芥穗 三錢

連翹 三錢

牛蒡子 三錢

歸尾 一錢

杏仁 三錢

南查炭 五錢

甘草 一錢

廿五 天密佈不齊身熱未退扁潤陷形色滯暗不能起脹那得成漿勉與

青毒之中兼活血提頂

犀角 三錢

羚羊角 三錢

白芷 二錢

銀花 三錢

苦桔梗 三錢

紫草 二錢

連翹 三錢

牛蒡子 三錢

皂針 一錢

杏仁 三錢

南查肉 二錢

天蟲 二錢

歸尾 二錢

雞冠血 每盞沖

甘草 一錢

時三

六天頭面雖有行漿之勢究竟週身平陷較昨日顏色暑潤耳仍與清毒活血提頂少加托裏

黃蓍 二錢

苦桔梗 五錢 全歸 三錢

犀角 三錢

牛蒡子 三錢

天蟲 二錢

杏仁 三錢

穿山甲 一錢

紫草 三錢

銀花 三錢

人中黃 一錢

白芷 二錢

連翹 三錢

鑲冠血 每盃四錢 尾針 一錢五分

日廿四

七天頭面行漿周身半塌空殼用伍氏內托法

綿黃耆 八錢

洋參 炒老黃色 一錢五分

炙甘草 一錢五分

苦桔梗 三錢

川芎 一錢五分

燕窩根 五錢

牛蒡子 炒研細 三錢

紫草 二錢

公雞湯 一茶碗

全當歸 三錢 白芷 二錢

鑲冠血 每盃三錢

日廿五

八天頭面漿足周身平塌者已起空殼者亦有行漿之勢翁仲仁謂喉嚨聲嘶漿行飽滿亦何妨再咬牙在七日以後周氣虛況其食少乎非陰虛

也

洋參沙老黃色一錢五分 苦桔梗五錢 白芷二錢 黃耆八錢

牛蒡子三錢 天蟲三錢 象貝二錢 公丁香四分

雞湯一茶盃 炙甘草一錢

廿六 九天漿已行及大半但氣虛作瀉看守勿懈毋令破損為要

綿黃耆一兩二錢 洋參二錢 象貝母三錢 苦桔梗六錢

白芷三錢 廣木香一錢 牛蒡子三錢 天蟲三錢

炙甘草三錢 冬白朮二錢

廿七 十天漿行已及十之七八惟痰咳微瀉眼中出膿為可慮

綿黃耆五錢 連翹一錢五分 穀精草一兩 焦冬朮三錢

桑葉一錢 生薏仁三錢 苦桔梗三錢 甘草一錢

土貝母三錢

日廿八 十一天溼重小便不利畏寒咬牙

生黃耆 五錢 洋參 一錢 穀精草 三錢 茯苓塊 三錢

薏仁 五錢 廣皮炭 一錢 焦冬朮 三錢 炙甘草 三錢

日廿九 十二天實脾利水以收痼止嘔加辛涼敗毒以護目疾

生黃耆 二錢 銀花 二錢 穀精草 三錢 茯苓塊 三錢

連翹 二錢 地骨皮 二錢 生薏仁 五錢 冬朮 三錢

炙甘草 一錢

十月初一日 十三天溼行痼結者過半氣化痼落者過半飲食甚好目開無恙已收

全功惟咳嗽減而未清仍宜實脾利水複以辛涼敗毒

茯苓塊 三錢 銀花 二錢 地骨皮 一錢 生薏仁 三錢

連翹 一錢 五穀蟲 一錢 炒冬朮 三錢 象貝 一錢

某七官 痘粒分顆原屬純正但熱毒頂平無漿間有二三陷者且有灰色明

日七朝氣血用事非峻補不可一切辛鑽走裏者必不可不用爲其溫中而托絡也其走表者斷不可用以其虛表而致癰瘍也再九日以後須防咳嗽泄瀉

初十 嵩女肝五個 相火用事民病溫防發痘先宜辛涼達表切忌發汗

銀花 二錢

苦桔梗 二錢 薄荷 五分

連翹 二錢

牛蒡子 二錢

甘草 一錢 芥穗 八分

杏仁粉 二錢

蘆根 三把

十一 險痘一天

銀花 二錢

苦桔梗 二錢 紫草 一錢

連翹 二錢

牛蒡子 二錢

薄荷 八分 芥穗 一錢

歸橫 八分

甘草 一錢

蘆根 一兩 煎湯代水

十二 脾經險痘二天色重粘連船小載重夜間煩躁先以活血敗毒

南查肉 三錢  
銀花 五錢  
地丁 三錢  
苦桔梗 二錢

連翹 二錢  
丹皮 二錢  
桃仁泥 八分  
犀角 一錢

當歸 土炒 八分  
人中黃 一錢  
大黃 一錢  
紅花 三分

豬尾湯 三小  
白茅根 一兩  
煎湯代水

十三 險痘三天色重粘連間有陷頂宜涼血提頂

犀角 八分  
羚羊角 二錢  
歸頭 八分  
連翹 二錢

細生地 一錢 五分  
紅花 五分  
銀花 一錢 五分  
活桔梗 一錢

甘草 八分  
丹皮 二錢  
白茅根 三錢  
蘆根 三把

十四 陰頭四天形色俱有起色但頂平便泄耳將就可望有成

生黃薔 三錢  
洋參 炒 一錢  
白茅根 三錢  
茯苓塊 三錢

銀花 炒 二錢  
炙甘草 一錢 五分  
白朮炭 二錢  
白芷 一錢

雞冠血 三小  
穿山甲 炒 一錢  
皂針 八分  
公雞湯煎藥

十五 五天即於前方內去銀花雞冠血加廣皮一錢

十六 六天雖然行漿但不可色灰便溲

綿黃耆 三錢 洋參 二錢美炒 廣木香 一錢 茯苓塊 三錢

肉果 五錢煨一錢 訶子肉 一錢 焦於朮 五錢 甘草 二錢炙二錢

廣皮炭 一錢 瀝煎

十七 七天業已回漿十分全功但便溲澄重仍有意外之虞法宜實脾利水

茯苓塊 三錢 洋參 一錢美炒 訶子肉 一錢 焦於朮 三錢

薏仁 三錢 廣皮炭 八分 廣木香 一錢 肉果 一錢煨一錢

炙甘草 一錢五分

癸亥十一月初十日 壽女 三歲

芥穗 一錢五分 苦桔梗 二錢 防風 一錢 杏仁 一錢

霍香葉 八分 桑葉 一錢 薄荷 八分 生甘草 一錢



蘆根 二把

連翹 二錢

日十一

重險痘一天熱一日而見點陽明絡現粘連成片汗多便溲氣虛毒重九

朝癰塌難防勉與提毒鬆肌

連翹 三錢

苦桔梗 三錢

歸尾 八分

桑葉 三錢

牛蒡子 研八

蘆根 五錢

丹皮 二錢

桑葉 三錢  
猪尾膏 三匙

銀花 五錢

甘草 一錢

紫花地丁 五錢與銀花先煎代水

日十二

出不爽快按未三歲之兒九日限期時刻有違限之慮即於前方內加

白茅根 五錢

犀角 一錢

日十三

重險痘三天面貌繁紅殼薄頂陷根鬆粘連成片身上色淡不起小便清

大便多而稀頭溫足冷應作氣虛不能送毒外出看總之九朝塌癰之症

勉與活血提頂而兼補氣

洋參 一錢

生綿薯 三錢 白芷 二錢

犀角 一錢

穿山甲 一錢

紅花 一錢 連翹 二錢

生甘草 一錢

皂針 一錢

歸尾 一錢 五分 豬尾膏 三匙入水 片二釐

叶十四

重險痘四天較昨日稍好然不能起脹焉得成漿場陷之症勉與提頂

犀角 二錢

生薑 五錢 白芷 二錢

杏仁 二錢

苦桔梗 二錢

紅花 一錢 銀花 二錢

穿山甲 一錢

皂針 一錢

薄荷 八分 雞冠血 五匙

甘草 一錢

叶十五

重險痘五天較昨日略好究竟不能起脹面紅身色灰白頭溫足冷虛寒

之極勉用辛溫而甘者助其元陽

生綿薯 五錢

洋參 二錢 穿山甲 二錢

焦白朮 五錢

半夏 一錢 五分

蘇紅花 一錢 廣木香 一錢 五分

白芷 二錢

公丁香 五分

煨肉果 八分 桑螵 生搗沖 一條

炙甘草 一錢 五分

濃煎如膏

日十六 六天虛寒亮殼急用峻補以救萬一

生綿薑 一兩

洋參 六錢

藏紅花 一錢五分

茯苓塊 三錢

鹿茸 五錢

穿山甲 三錢

焦於朮 四錢

歸身 土炒 三錢

廣皮炭 二錢

廣木香 三錢 白芷 三錢

炙甘草 三錢

煨肉果 一錢五分

老公雞湯煎如膏

日十七 七天殼薄無漿便澹氣血兩虛用陳文仲法

生綿薑 一兩

洋參 三錢 姜炒

煨訶子 二錢

鹿茸尖 酒炒 六錢

猪桂 去皮淨 八分

公丁香 八分

焦於朮 二錢

半夏 一錢五分

廣皮炭 一錢五分

廣木香 煨 二錢 白芷 二錢

炙甘草 三錢

煨肉果 二錢

公雞湯煎如膏

日十八 八天咬牙泄瀉目開殼薄無漿皆係虛寒場癢之象急用陳文仲大異功

散法惜無方用參耳

黨參 五錢

熟附子 一錢

茯苓 三錢

洋參 五錢

廣木香 三錢

白芷 二錢

於朮 四錢

肉果霜 三錢

廣皮 二錢

綿萆 三錢

訶子肉 三錢

炙甘草 三錢

搖桂 一錢

公丁香 三錢

濃煎如膏分六七次服

十九日 九天昨用陳文仲大異功仍然塌陷咬牙水漿不得入口然根盤未散斷

不可棄而不治議於前方內加

肉果 一錢

公丁香 一錢

連服二帖

二十日 十天昨日此方連服二帖頭面業已行漿下身仍然灰白塌陷再用前方

二帖

廿一日 十一天痘灰白色漿不足必陷仍服前方二帖

廿二日 十二天頭面漿足四肢空殼尚多於前方內改肉桂為桂枝再服二帖

吳氏醫案

痘症

廿三 十三天仍須托裏溫中白日服完夜間再服半帖皆可

廿四 十四天灰白咬牙泄瀉猶在險途

生綿葛 五錢 洋參 五錢 公丁香 六錢 肉果霜 六錢

黨參 五錢 生薏仁 五錢 茯苓塊 五錢 桂枝 五錢

廣木香 五錢 於白朮 五錢 白芷 三錢 炙甘草 三錢

訶子肉 三錢 廣皮 三錢 水九碗濃煎如膏

癸亥十二 六重險痘三天骨立無肉血枯而燥乾紅色暗粘連成片皆隱在月初四日徐戢

皮中乃梟毒把持之故勉與兩解靈法若照常理立方恐緩長莫及

紫花地丁 一兩 大黃 半生半 查肉 半生半 暹羅犀角 一兩

桃仁 半生半 銀花 二兩 紅花 三錢 青皮 二兩

小豬尾血 每半 酒盃 水八碗煮成三碗先服半碗約二時再進以舌苔退

痘起發為度

初五 重險痘四天天下後業已起發不必再用沈降議涼血提頂

銀花 八錢 烏犀角 八錢 羚羊角 五錢 連翹 五錢

紫花丁 五錢 人中黃 三錢 白芷 二錢 苦桔梗 五錢

白茅根 一兩 皂針 二錢

初六 重險痘五天大有起色仍宜涼血活血兼與敗毒

銀花 八錢 細生地 八錢 紫花丁 五錢 連翹 四錢

苦桔梗 五錢 人中黃 二錢 犀角 五錢 羚羊角 五錢

白茅根 一兩 白芷 三錢 分四次服

初七 重險痘六天雖然行漿但火毒太重不必用補亦不可用補猶宜涼血解毒以爲結痂之地

毒以爲結痂之地

細生地 一兩 銀花 八錢 苦桔梗 五錢 烏犀角 一兩

連翹 三錢 人中黃 二錢 粉丹皮 八錢 元參 五錢

白茅根 一兩  
紫花丁 六錢

初八 七天於前方內減犀角一半加麥冬 五錢

初九 八天漿已滿尼色已蒼胃已旺議辛涼以助結痂之用

銀花 三錢  
白茅根 五錢  
麥冬 不去心 五錢  
連翹 三錢

五穀蟲 一錢  
甘草 一錢五分

初十 九天四肢太熱非重用辛涼其痂不結

銀花 五錢  
細生地 三錢  
元參 五錢  
連翹 五錢

白茅根 六錢  
丹皮 五錢  
麥冬 不去心 八錢  
生甘草 一錢五分

黃芩 酒炒黑一錢五分

十一 十天回漿甚緩微咳用辛涼小兼實脾

細生地 三錢  
連翹 三錢  
粉丹皮 三錢  
生薏仁 五錢

麥冬 不去心 三錢  
人中黃 一錢  
地骨皮 一錢  
黃芩 一錢

白茅根 三錢 冬桑葉 一錢

日二十一 天仍服前方一帖

日三十二 天再服前方一帖

日五十四 天十分全功惟敗餘毒而已

仙人杖皮 二錢 連翹 三錢 五穀蟲 二錢 人中黃 一錢五分

丹皮 三錢 白茅根 三錢

癸亥十二月十三日 呂女重險痘二天色重粘連成片攢簇頗多第一方以達外感活血

鬆肌爲法

薄荷 一錢 牛蒡子 三錢 當歸 一錢 芥穗 二錢

南紅花 一錢 前胡 一錢 半夏 二錢 苦桔梗 三錢

蘇葉 一錢 杏仁 三錢 生甘草 一錢

十四日 早第二方以提開爲毒爲主蓋攢簇者必攻也況色重乎

吳氏醫案

痘症

完



生大黃

生青土

桃仁

半生半炭六錢

南山查

半生半炭六錢

苦桔根

四錢

青皮

四錢

人中黃

二錢

猪尾膏

一小盃研入上指冰五釐

每次沖三小匙

申刻

重險痘三天早用必勝法現在顏色已退唇重色絳抱髮頭腰中腎俞

太重弄舌嘔噦心火太重志識以涼重敗毒

次生地

三錢

杏仁

三錢

全歸

三錢

羚羊角

三錢

犀角

六錢

川連

一錢

苦桔梗

三錢

銀花

三錢

廣皮

一錢五分

牛蒡子

二錢

連翹

三錢

甘草

一錢五分

猪尾膏

每次三匙

研入大冰片五釐

十五

險中逆痘四天氣既虛而毒又重色暗根鬆痛澀殼薄頭溫足冷抱髮頂

腰下不可補又不可此其所以難也勉與活血提頂

苦桔梗

六錢

犀角

五錢

銀花

五錢

紫花丁

五錢

全歸 三錢

白芷 三錢

穿山甲 二錢

查肉 六錢

皂針 三錢

人中黃 三錢

丹皮 五錢

紅花 一錢五分

研入水  
生香 豬尾膏 每次沖  
奪命丹 三粒

十六 險中逆痘五天較昨日雖有起色究竟色滯而重板着不行二日不大便

皆係臬毒把持恐不能行漿若過此關則不能再用沉降矣謹必勝法

桃仁 生炒各  
半一兩

生大黃 生薑  
少兩 紅花 一錢五分

查肉 炒一  
兩

苦桔梗 六錢

甘草 三錢 青皮 六錢

十七 險中逆痘六天昨日復用必勝法雖有起色究竟頭面不如過身之半臬

毒把持陽亢可知

紫花丁 五錢

大黃 酒炒  
五錢 黑

白芷 三錢

苦桔梗 五錢

犀角 五錢

紅花 二錢

南查炭 三錢

銀花 五錢

皂針 二錢

穿山甲 炙二  
錢

全歸 三錢

廣皮 二錢

吳氏醫案

痘症

罕

人中黃 三錢

十八 險中逆痘七天頭面起發色鮮週身色淡逆者已順現有行漿之勢一以

上藥為主

黨參 五錢

生綿著 一兩 和豆大 歸身 二錢 土炒

洋參 三錢 姜炒

茯苓塊 三錢

防風 三錢 桂枝 五錢

炒廣皮 二錢

白芷 三錢

於朮 三錢 炙甘草 三錢

十九 八天照前方再服二帖

二十 九天身上色灰四肢尚空大便頻仍寒戰發瘰皆係虛象急急用陳文仲

法防其內陷

黨參 三錢

茯苓塊 五錢 半夏 三錢

洋參 三錢 姜汁炒

肉果霜 五錢

白芷 三錢 於朮 五錢 土炒

訶子肉 五錢

廣皮 三錢

官桂 一錢 去粗皮 廣木香 三錢

甘草 三錢

附子熟一錢 大棗肉二枚 生薑三片

咬牙加公丁香三錢 第二帖做極細末

廿一將昨日第二帖之末藥每服三錢約兩三時辰做一服

甲子正月 呂男二歲 狀元痘原不必服藥但現在半生半熟泄瀉唇色寒猶恐遺

毒損目議溫托法

生雞薥三錢 黨參二錢 訶子肉二錢 茯苓塊三錢

白朮一錢 生薏仁二錢 製半夏一錢 廣皮一錢

炙甘草三錢

初六汪男三歲 初報痘點形即繁重表虛脈滑心熱恣甚謹防八九朝癢塌且與

辛涼解肌透毒

銀花五錢 苦桔梗五錢 丹皮三錢 連翹連心二錢

牛蒡子三錢 全歸一錢 薄荷三分 杏仁泥二錢

初七 險痘一天頭面粘連點現癰關足涼非純然毒重亦非純然氣虛且與活

血緊肌擺毒大涼大溫皆在難施之例

犀角 錢五

苦桔梗 五錢 全歸 一錢五分

銀花 五錢

牛蒡子 一錢

青皮 二錢 連翹 三錢

南查炭 三錢

甘草 二錢

薄荷 八分 猪尾膏 三匙

外以胡荽酒洗足

初八 險痘二天半但唇腫右額腫心脾之火甚也足已溫痘苗稍大者即頂陷

白茅根 一兩

犀角 五錢 查肉 一錢五分

紫花丁 五錢

銀花 五錢

紅花 八分 苦桔梗 三錢

連翹 三錢

廣皮 八分

牛蒡子 二錢 全歸 二錢

甘草 一錢五分

猪尾膏 三匙

按白茅根秉燥金之體感風木而花藏胎內異於眾草生發最速其性

喜潔故能化毒開清其味甘涼故能走肺胃而不傷肺胃之陰本草稱其主衄症蓋言其所然而不言其所以然也但此物性平和不假以重權不爲功也凡一切清竅病用之最良而痘症中護眼護喉走清道血分爲尤良也

初九

險痘三天半兩額兩眼肉腫瘡不腫心脾之火太甚也血無不活故今日不加血藥

羚羊角 五錢

元參 五錢

細生地 三錢

烏犀角 五錢

銀花 五錢

紫花丁 五錢

苦桔梗 六錢

連翹 三錢

白茅根 一兩

牛蒡子 五錢

白芷 二錢

生甘草 一錢五分

穀精草 三錢

初十

重險痘四天半額滿於額額滯於身此陽火有餘之象雖不必大下仍以敗毒爲主而提頂次之

羚羊角 五錢

犀角 五錢

紫花丁 五錢

次生地 五錢

銀花 五錢

穀精草 三錢

苦桔梗 五錢

元參 二錢

真山連 五分

牛蒡子 二錢

黃芩 三錢

生甘草 二錢

白茅根 一兩

十二茶盃水煮五盃分十次服

十一

五天半已有行漿之勢不必提頂托漿但喉已聲啞趁此猶係外感用事之時仍用昨日方開提肺氣敗毒滅其蒸騰鍊毒之火使歸於和平即行此陽火痘之漿法所謂道無定體者此也高明以爲何如

仍用昨日方一帖限明日黎明服完

十二

六天半面已有漿四肢腰背皆空五更大便兩次痛快而澹今晚已入氣血用事之關須漸進補托兼與清毒

炙綿菁 三錢

黨參 一錢

白茅根 六錢

烏犀角 三錢

銀花 三錢

苦桔梗 一錢

冬白朮 二錢

白芷 二錢

廣皮炭 一錢  
茯苓塊 三錢  
日入後服

十三天半頭面漿已七八腰背不足四肢尙空今日正是氣血當令已有瘰

瘰必得扶其不及多得一分漿少得一分後患此身小痘多之定法也

生綿著 五錢  
白朮 三錢土炒黃  
藏紅花 一錢  
茯苓塊 三錢

黨參 三錢  
廣皮炭 五錢  
廣木香 一錢  
白芷 二錢

炙甘草 一錢  
五分

十四晚足九天於前方內去紅花

十五十天漿足色蒼形勢圓綻四肢陸續上漿皮膚捫之平和不冷亦不過熱

脈洪數有力合觀皆情理之正其不食畏縮皆病象也痘多漿亦多鍊氣  
血而成漿痛亦情理之正斷非陷症議補氣以勝痛活絡以定痛法似不  
岐於路矣

人參 五分  
生綿著 三錢  
紅花 四分  
冬朮 三錢



熟綿葛 二錢

厚樸 六分

乳香 八分

扶苓塊 三錢

廣皮 一錢

沒藥 八分

廣木香 一錢

甘草 三錢

白芷 二錢

日十六 十一天大勢已有成功之象猶須防其泄瀉作癢

扶苓塊 三錢

洋參 炒黃 一錢

廣木香 煨 八分

炒冬朮 二錢

黨參 二錢

炙甘草 一錢 焦白芍 二錢

廣皮 炒半黑 一錢

日十七 十二天小便長大便秘暫與宣化腸胃

扶苓塊 三錢

黨參 一錢 五分

五穀蟲 三錢

穀精草 三錢

厚樸 一錢

日十八 十三天痘後肺液受傷渴而咳

沙參 三錢

地骨皮 三錢

象貝 一錢 五分

麥冬 三錢

白茅根 六錢

薏根 三錢

廿六 某男 風溫發熱三天耳冷尻冷已有微點謹防天花法宜辛涼解肌芳

香透絡最忌三陽表藥多汗致成癰瘍

銀花 三錢 苦桔梗 三錢 芥穗 一錢 連翹 三錢

牛蒡子 炒研 二錢 桑葉 三錢 薄荷 八分 白茅根 三錢

甘草 一錢

當日晚大瀉水煎加 黃芩 三錢 瀉止

廿七 虛寒痘二朝甫二日熱退其半神氣安靜大便澹泄佈痘不多亦屬均稱

但痘形扁闊根鬆色亦過淡觀其皮色脾經素有飲食傷損議異功保元

合法

生綿著 三錢 人參 一錢 廣木香 一錢 雪苓塊 三錢

廣皮 二錢 炙甘草 二錢 生於朮 二錢

廿八 仍用前方

吳氏醫案

痘症

初七 十二朝痘雖稀少發行薄弱腰下尙未結痂乘此機會再用保元以助餘

漿

雲苓塊 三錢

人參 一錢

炙甘草 一錢五分

生薏仁 三錢

綿舊 三錢

初八 仍用前方

補案 辛巳年述

癸酉初夏余有澣水之游長女甫二齡於四月十一日見點至

廿五日已半月矣余適回家見其形勢鼓立者半頂陷者半根抱者半散

者半毫無汁漿本係謝寶靈兄調治因請同看伊立一方余視之曰此方

若上得起漿甘受重罰此方若上不起漿亦受重罰謝兄愕然曰足下左

右皆受罰何故余曰今且不必明言明日來視漿色伊去後余仍用其方

此方乃原方所有包好重耳

照方製廿帖加燕窩十二兩大公雞一隻重九觔紫河車一具並藥其十

餘勦先分九鍋煎去渣後復并一鍋煎自早之暮不敢草率成藥膏得二

槐許令乃母飲半茶杯小人飲半酒杯二鼓時其母因乳脹謂余曰藥甚  
靈余無乳者已數日今忽蓬蓬豈非藥力乎余曰可急令小兒吮之彼曰  
小兒不得寐者已數日今方熟睡可驚之乎余曰限期已緊所以令汝服  
藥爲以乳汁上漿也今乳脹可與之吃矣因促之醒痛吮一飽少時又解  
渴下三鼓清漿如露矣未至四鼓又令母女服藥如前四鼓未寢藥如前  
色五鼓以後又如茶色濃厚如及時之漿然天明已十七朝矣又延周兄  
至彼一視曰奇哉何因得此余曰用君原方彼曰只添得燕窩一味何神  
止此余曰余昨云此方若上得起漿甘受重罰者先生於七八朝卽用此  
方彼時氣血方壯毫無汁漿今以十五朝氣血消耗豈能上漿乎余又謂  
此方不能上漿亦受重罰者以先生之方若錯小女早不活矣因令伊執  
方之背面視之伊見照方甘帖之文又令視諸藥渣因謝曰余實不能

二十

某女

十九朝痘後便瀉而頻久則脾胃兩傷得瀉爲穩

吳氏醫案



痘症

望

眞雲苓 五錢

白朮 三錢

肉果霜 三錢

生薏仁 五錢

半夏 一錢

訶子肉 三錢

廿四 實脾利水之中兼化清氣

雲苓 五錢

生薏仁 五錢

晚臨沙 三錢

於朮 三錢

地骨皮 三錢

五穀蟲 三錢

蟬退 七枚

炙甘草 一錢五分

初一日 三十天痘後餘毒腫潰補托之中加以敗毒

人參 一錢

生薏仁 五錢

黃蘗 三錢

於朮 三錢

五穀蟲 三錢

銀花 三錢

雲苓 三錢

初四日 痘後餘毒腫潰稍加銀花大便即通議於前方去銀花加肉果訶子

茯苓 三錢

人參 一錢

廣木香 一錢

生薏仁 五錢

於朮 三錢

五穀蟲 二錢

肉果霜 一錢

黃蘗 三錢

炙甘草 一錢

訶子肉 三錢

五分

初七 三十六天痘毒潰爛應照潰瘍例即用痘科門中之保元合異功法

人參 一錢  
生薏仁 三錢  
於朮 二錢  
雲苓 五錢

炙甘草 二錢  
廣皮 一錢  
綿蒼 五錢

初八 傷食暮熱嘔吐痘後太飽之故與止渴消食其熱自止調理飲食要緊

茯苓 三錢  
地骨皮 三錢  
薏仁 三錢  
半夏 二錢

炒廣皮 一錢  
神麴 一錢  
五分

二十 某男 風木司天之年又當風木司令之候風木內含相火時有痘疹無

論但受風溫身熱而不發痘或因風溫而竟發痘或發斑疹皆忌辛溫表藥性與辛涼解肌透絡為穩此時醫所不知蓋風淫所勝治以辛涼佐以

苦甘內經之正法也

銀花 三錢  
苦桔梗 三錢  
薄荷 八分  
連翹 三錢

牛蒡子 一錢  
桑葉 三錢  
芥穗 一錢  
鮮蘆根 五錢

甘草 一錢

二帖 此方治痘初起多能化少  
涼絡而易出見點亦服此

廿一日 申刻 險瀕逆痘二天痘色醜紅唇赤舌赤見點繁瑣三五成羣毒參陽位勉

與涼血擬毒

石膏 生末一兩八錢

生大黃 炒黑三錢 地丁 紫花三錢

犀角 五錢

苦桔梗 三錢

桃仁 三錢 銀花 五錢

人中黃 三錢

地龍 三錢

連翹 三錢 白茅根 三錢

丹皮 三錢

此案為鈔錄者失去十四帖大意以犀角地黃湯加連翹銀花白茅根  
細生地等一味涼血收功至十五朝猶用犀角十六朝以辛涼清餘熱  
一方服至廿一朝

乙酉六月 廿二日 十二姑 九暑傷兩太陰身熱而嘔舌白滑

雲苓皮 四錢

連翹 三錢

藿香葉 二錢

生薏仁 三錢

銀花 三錢

白薏仁 一錢 穀半夏 三錢

杏仁 三錢

黃芩炭 二錢

廿三

痘三天頂平根鬆色暗夾虛夾毒之症與活血提頂敗毒扶到七天方好

補托

苦梗 三錢

牛蒡子 二錢 白芷 三錢

防風 三錢

紫花丁 二錢

紅花 二錢 連翹 二錢

人中黃 一錢五分

全歸 二錢

銀花 三錢 紫草茸 一錢

查炭 二錢

廿四

痘四天頂平根鬆色暗便閉不食昨用活血敗毒宣絡今夜已見大便熱

退能食頭面已有起脹之勢前後心續出盈干皆根泛頂平暗滯稍大者

頂卽陷應照虛寒制治與宣氣活絡提頂不得過用敗毒清裏致令使滯

內陷

當歸 土炒 二錢

藏紅花 二錢 查炭 二錢

防風 二錢

吳氏醫案

痘症

完



廣木香 一錢

蘑菇 一錢

銀花 三錢

穿山甲 炒一錢

甘草 炙五

白芷 三錢

廣皮炭 二錢

日廿五

痘五天頂平帶陷根鬆色暗昨日卽照虛寒例治而用溫煦芳香今日口並不渴而舌苔白厚盛暑之際尙兼足太陰之暑溼症七日以前外感用事必視其在何臟腑而清之以爲七日以後上漿之地

茯苓皮 三錢

當歸 土炒三錢

六一散 三錢

生薏仁 三錢

銀花 四錢

藏紅花 二錢

廣木香 一錢

防風 三錢

廣皮炭 二錢

白豆蔻 一錢

白芷 三錢

煮四小杯分四次服

日廿六

痘六天頂平多陷根鬆色暗頭面色已華前後心尙多陷而暗身痛口不渴與活血提頂令其易於上漿

當歸 土炒三錢

生綿薑 五錢

紅花 二錢

銀花 五錢

穿山甲 三錢

白芷 三錢

乳香 一錢

廣木香 二錢

廣皮 三錢  
沒藥 二錢  
雞冠血 每杯貼 三匙  
甘草 炙三錢

公雞湯煎煮三杯分三次服

廿七 七朝已有行漿之勢平頂陷頂尙多加補托以助之

廿八 痘八天頭面行漿已有七成臂次于手足次于胸腹也胸以下陷頂多面

色灰仍須溫煦以助行漿之勢

綿薑 八錢  
高麗參 三錢  
白芷 三錢  
防風 三錢

扶苓塊 三錢  
紅花 二錢  
當歸 三錢  
土炒  
廣木香 三錢

甘草 炙一錢  
廣皮 三錢

廿九 痘九天正在行漿之際便頻眼開卽是虛象粘連之處顏色卽灰其虛而

何急急補托而兼溫煦爲要

人參 三錢  
炙綿薑 一面  
白芷 二錢  
於朮 炒三錢  
肉果霜 三錢  
廣皮 三錢  
茯苓 三錢  
廣木香 二錢

甘草 炙三錢

防風 三錢

七月初十日雖已結痂未十分滿足尚有正行漿之處仍用前方再為補托

明日再與收痂未遲

初二日十一天痘已結痂未十分滿足之故皆因連日便頻受暑積滯而成痂

疾先疑溫下其積今視四肢鼓立胸前全陷並非正結恐一進沉降竝四肢而亦陷矣前方係必不可不用之藥茲且暫停勉與實脾利水以結痂

少加化積俟十四朝之後痘勢收場如積滯未化再與下法

生薏仁 五錢

茯苓 連皮五錢

黃芩 炭一錢五分

焦白芍 二錢

檳榔 二錢

真山連 一錢

益智仁 二錢

神麴 炒三錢

廣皮炭 三錢

南查炭 三錢

初三日痘十二天仍服前方

初四日痘十三天業已結痂原可妥當收功不意盛暑流行之際食物不化致

欲便先痛便後痛減裏急後重之痢疾法當溫下假使畏縮不前拖延日久必無好音莫若乘此邪氣初聚之時急奪其邪冀邪去正存方收拾一切未完也

生大黃五錢

白芍三錢

炒黃芩三錢

熟附子二錢

檳榔三錢

小枳實三錢

赤芍桂一錢五分

神麴四錢

廣皮炭三錢

真山連二錢

查炭三錢

煮成三杯先服一杯候一二時俟其再便腹不痛即勿服腹仍痛再服第二杯三杯亦如之

初五

痘十四天四肢結痂十有其五昨日服藥後腹痛愈甚便中糞多積少日夜其七八次今用前方減附子一錢搖桂二分服後已刻至未刻便紅積一次腹中仍痛糞色如赭後二杯即加赤搖桂八分約服一杯半腹痛即便紅積仍有糞色黃夜半服第三杯丑寅時連便兩次糞色仍赭微有紅

積腹仍微痛

日初六 痘十五天膝下至足趾痂尚未結全已刻便一次燥黃黃色兼赭色滯黃

微帶紅積腹不痛午刻服下第一杯至亥刻便一次糞色黃丑刻便一次無積糞黃

高麗參 三錢

白芍 錢三

黃芩炭 一錢五分

雲苓皮 五錢

檳榔 二錢

赤桂心 一錢五分

生薏仁 五錢

山連 一錢

廣皮炭 三錢

南查炭 二錢

神麴 錢三

炙甘草 一錢

日初七 痘十六天痂已結齊痂已痊可不必服藥目稍微腫穀精草泡茶飲之

日初八 青睛有雲翳速清睛絡之熱毒

穀精草 四錢

連翹 三錢

青箱子 三錢

茶菊花 三錢

桑葉 三錢

日初九 痘漿未足毒流膿絡故青睛白翳又感時令燥氣化火故白睛起太陰睛

瘡考古治法以六味丸作湯改茯苓為君再加清續絡之熱毒以退翳

茯苓 四錢  
銀精草 三錢  
萸肉 一錢  
生地 二錢

茶菊花 二錢  
丹皮 二錢  
山藥 一錢  
青箱子 二錢

桑葉 二錢  
澤瀉 一錢

初十 仍照前方服內加 銀花 五錢 連翹 三錢 生甘草 一錢  
目內白

翳稍退煩躁常哭因痘後血虛化燥故也與甘麥大棗湯主之

甘草 生一錢 小麥 七合 大棗 五枚  
煮粥服之

十一 因瘡痛而哭目內白翳仍有身上起大小瘡十數粒復生細痘在舊痂窩

內痘漿未足流毒成瘡故也仍服初九日方

十二 目內白翳退太陰睛瘡仍在瘡未見消落原方再服

十三 目內太陰睛瘡仍在續出之瘡痘未退仍服原方瘡貼紫草膏如爛草炭

十四 服原方一帖

吳氏醫案

痘症

辛

十五 未服藥

十六 目內太陰睛瘡稍退仍有翳身上瘡痂已落者復生小瘡未落之處復有

倒漿欲潰總之流毒未清之故也原方再服目內翳以四退散治之

十七 至廿三日 痘已滿月目內太陰睛瘡未淨翳仍在仍服原方又服錢氏蟬退散一

日二服 蟬退爲末每服一錢羊肝湯下日二服

四退散 主治目睛老翳

人退 卽手  
指甲

蛇退

雞退 卽鳳  
凰衣

蟬退

每藥一兩加頂高梅冰片一分左眼右鼻間右眼左鼻

間每聞少許兩月全愈

十八 至廿月 趙女 歲十 體堅痘少原可不必服藥但愈少漿更不可不足舌苔厚中

黃邊白且與清毒一帖明日再與托漿一帖

苦桔梗 一錢

連翹 三錢

人中黃 八分

牛蒡子 一錢  
五分

銀花 三錢

鮮荷葉 一角 全當歸 一錢五分

煮二小杯分三次服

十六 於前方內加

生綿薯 四錢 白芷 五分

黨參 三錢 炙甘草 一錢五分

十七 辛涼結痂古之正法也質脾利水亦有溼者所宜施之茲當暑月舌苔厚

而白溼也身熱未盡退熱也二法可合用

銀花 三錢

茯苓塊 蓮皮 蘆根 三錢

連翹 三錢

生薏仁 三錢

福一 三天佈痘稀疏苗頭純正但色白皮薄之兒頂平根鬆色淡有殼薄無漿

之慮雖在初起即用保元湯為當

黨參 三錢

連翹 二錢 紅花 三錢

綿薑 生三錢

銀花 三錢

甘草 二錢 胡荽 一根

服三帖

五朝 氣血兩虛之症色淡根鬆頂平大便瀉泄而頻痘不鼓立為得成漿漿

既清薄痂必不厚雖係順症有痘後壞目牙疳之慮此等症舉世輕忽之



及至壞証已現必不可為余見之屢矣議陳氏木香散法必得漿足結痂為要

綿蒼蘘

炙五錢

高麗參

三錢

廣皮

一錢五分

於朮

二錢

茯苓塊

二錢

甘草

炙二錢

白芷

二錢

肉果霜

三錢

生薑

二片

木香

一錢

訶子肉

三錢

大棗

去核一枚

七朝

痘已成漿兼有結痂究竟未滿足大便仍滯於前方內去高麗參訶子

白芷再服三帖收功

廿九

某見點之初神氣昏冒先開心包透絡繼以辛涼達表使其易出而

後法切忌發汗傷無辜之表

紫雪丹

二錢

分四次服涼開水送以神清為度

辛涼散

七包

二時服一包

初一日

頭面色赤而頂平根寬鬆反不如腰以下鼓立甫三日小便濁須兼分利

形體胖本係溼胎應照毒搏前治扶過六七朝以後能用補托方妙

茯苓皮 四錢 猪苓 三錢 白通草 一錢 苦桔梗 三錢

澤瀉 三錢 芥穗 二錢 牛蒡子 炒研一連翹 三錢

甘草 五分 紫地丁 二錢 銀花 五錢 鼠根 五錢

晚蠶沙 二錢 醫者補偏救弊之謂也三五日前見有何處偏勝及時

去之以免七日以後糾纏時人不知以為此等方非治症也

初二四天色陷頂平根鬆夜間煩燥毒氣未化氣分更虛與化毒提頂

連翹 三錢 紫地丁 三錢 白芷 二錢 銀花 三錢

苦桔梗 三錢 甘草 二錢 丹皮 三錢 牛蒡子 二錢

葦根 五錢 防風 二錢 白茅根 三錢 煮兩六杯分四次服

初三五天根已抱住頂平皮薄議於此毒之中稍加安表

苦桔梗 三錢 綿蒼 生三 防風 二錢 牛蒡子 炒研三錢

連翹 三錢

白芷 二錢

人中黃 二錢

銀花 三錢

葦根 五錢

白茅根 三錢

初四

六天面色佳惟頂間有平者身上色淡時有癢意表虛皮薄之症重與實

表提頂

洋參 二錢

生綿耆 六錢 白芷 二錢

銀花 三錢

炙甘草 三錢

蘆根 五錢 防風 二錢

初五

七天面上稍有渾漿餘皆清而皮薄急急內托為要體胖溼多加蒼朮頂

為收痂之地又合小異功法

人參 三錢

生綿耆 一兩 廣皮 三錢

於朮 三錢

雲苓塊 三錢

生薑 三片 防風 三錢

廣木香 二錢

大棗 二枚

白芷 三錢

初六

仍用前方加

肉果霜 二錢

初七 照前方再服一帖

初八 淫體虛痘十天雖已回痂之期但破損太多仍然發癢暫與護表實脾一

帖明朝再議

生綿葛 五錢 防風 二錢 生薏仁 三錢 茯苓塊 五錢

白芷 二錢 廣皮炭 二錢 炒白朮 三錢

初八 某 險兼逆痘六天額額擠聚本係毒重色白皮薄痘頂下陷頭溫足冷

根最不紅氣血兩虛先與提頂將來能受陳文仲法方望成功

人參 一錢 煨肉果 二錢 紅花 三錢 綿葛 生五錢

穿山甲 一錢 廣皮 二錢 防風 三錢 廣木香 一錢 五分

甘草 二錢 白芷 二錢

初九 險兼逆痘七天昨用陳氏溫托法今日稍有起色但頂陷者尚多已百計

破亦且汗多不能滿湛焉能鍊毒成漿今日再以陳氏木香散法溫中托

吳氏醫案

痘症

三

絡母使內陷癰瘍看守勿懈不致再有破損方可有望

人參一錢五分

廣木香三錢 白芷三錢

綿薯八錢

肉果霜二錢

半夏三錢 於朮二錢

藏紅花一錢五分

廣皮二錢

防風三錢 公丁香一錢

甘草三錢

歸身二錢

再加公雞冠血以提頂

初十日便溲而頻加訶子肉餘藥加分量以助漿

自初十日至十五日皆服此方惟分量加重

十六日白痘十四朝頭面雖然漿足兩足尚在行漿其勢未能十分充滿猶然大

便頻數又有咳嗽設大便不調尚在險關仍須補澁兼充養已喪之氣血

立方候裁

人參七分

廣木香二錢五分 訶子二錢五分

於朮炒三錢

肉果霜二錢五分

半夏一錢 雲苓二錢

赤石脂二錢

廣皮炒二錢五分 薏仁 五錢

廿二歲十一痘後餘毒未清又加溫癰陽明發斑口臭之極唇腫而黑目腫而閉胃幾爛矣急救猶恐不及況再緩乎

元參 一兩

生石膏

八兩

知母 二兩

麥冬

不去心 一兩

烏犀角 一兩

丹皮 一兩

銀花 一兩

人中黃

五錢

一時計服一茶杯

廿四日得大效原方再服一帖勻二

廿六日

於原方內減元參為三錢加

射干 五錢

黃芩

五錢

丙戌九月十四日

色五歲秋日燥氣化火現在君火客氣司令或有發痘之孩本有自汗

何可再以羌活發汗致令表虛身壯熱肢厥舌黃赤口渴脈洪大而數晚間微有譫語大便結皆火証也皮色黃痘之頂平根鬆氣虛苗也先以辛涼藥風擺毒清熱扶過七日能用補托方妙

生石膏 五錢

元參 三錢

炒黃芩 二錢

苦桔梗 三錢

連翹 三錢

全當歸 一錢五分

牛蒡子 二錢

銀花 三錢

人中黃 一錢五分

紫地丁 二錢

外紫雪丹 六分 夜間服

日十五

險痘三天半尚未出齊稍大者業已頂陷其為氣虛可知雖不大便未可  
沉降與活血提頂提毒

次生地 五錢

苦桔梗 三錢

全歸 二錢

元參 三錢

牛蒡子 三錢

黃芩 二錢

連翹 三錢

紫草茸 三錢

白芷 二錢

銀花 三錢

人中黃 一錢五分

煮三杯分三次服

日十六

險痘四天頭面顏色雖重腿脚甚淡頂陷者不少大便已見舌尖有紅刺  
而苔白柔潤宜甚謹防大便溏滑夢語仍有口仍渴且與辛涼清上芳香  
透絡使火毒及熱邪從內達外

苦桔梗 三錢

連翹 三錢

天虫 二錢

皂角刺 二錢

銀花 三錢

白芷 三錢

白茅根 三錢

杏仁 二錢

黃芩 一錢五分

人中黃 二錢

煮三杯分三次服

另和服局方至寶丹一丸

叶七

五天陷者稍起色漸勻寐稍安舌苔白膩是中宮食滯未清口仍渴上焦之熱未退仍用前法兼與和中

杏仁 三錢

苦桔梗 三錢

白芷 三錢

連翹 半錢半

藏紅花 一錢

黃芩 二錢

丹皮 三錢

南查炭 二錢

廣皮 一錢五分

皂針 二錢

生甘草 一錢五分

另服局方至寶丹一丸

叶八

六天身半以上清淨七八惟腿過半顏色尙屬適中頂平便滑舌白氣虛有溼之徵今日宜與補托清上仍不可少中焦有滯必須急急清理能

受補劑厚味方妙

吳氏醫案

已症

重



生綿耆 二錢

於朮 二錢

炒神麴 三錢

苦桔梗 三錢

白芷 三錢

廣皮炭 一錢

五分雲苓塊 連皮 四錢

銀花 一錢 五分

生甘草 一錢 五分

運翹心 三錢

查炭 三錢

煮三杯分三次服

日十九

七日有奇正氣血用事之期漿行尚不顯預頭面顏色亦佳身上與四肢微覺稍暗四末微涼大便澹微嘔皆脾陽不足之象今日疎補為宜稍加香溫托裏

生綿耆 五錢

白芷 三錢

高麗參 二錢

雲苓塊 五錢

查炭 二錢

廣木香 三錢

炒於朮 四錢

廣皮 三錢

去淨油  
肉果霜 一錢 五分

豈半夏 三錢

煮三杯分三次服

日二十

八天半漿不十分濃足食少便澹尚覺安靜周身有疼痛之象氣虛而溼重難於峻補仍以補脾滲溼為主稍加宣絡定痛仍須看守防護不致再有損傷要緊

生綿薯 五錢

於朮 錢炒三

肉果霜 一錢五分

雲苓塊 五錢

半夏 三錢

廣皮炭 三錢

穀精草 三錢

白芷 二錢

炙甘草 二錢

訶子肉 錢煨三

濃煎三小杯分三四次服

日廿一

九天漿未滿足眼開太早大便稀溏有痘毒目疾之虞喜胃開進食仍宜

補益

生綿薯 六錢

人參 三錢

肉果霜 三錢

訶子肉 錢煨三

於朮 錢炒三

廣皮炭 三錢

穀精草 三錢

半夏 三錢

炙甘草 二錢

廣木香 二錢

白芷 二錢

煮三杯分三次服

日廿二

漿未滿足即已收痂氣虛火歉大便已止且免收滿與實脾為主

雲苓塊 五錢

人參 一錢五分

穀精草 三錢

炒於朮 四錢

半夏 三錢

五穀蟲 三錢

生薏仁 五錢

白芷 二錢

廣橘皮 三錢

廣木香 三錢

煮三杯分三次服

廿三 實脾兼敗餘毒

雲苓塊 三錢

於朮 五錢

廣木香 一錢

生薏仁 三錢

銀花 炒三錢

黃芩炭 一錢

穀精草 三錢

歸鬚 一錢

五穀蟲 一錢五分

廿四 氣虛溼重之痘甫經落痂即作滯下舌苔白滑唇淡而宜浮脾溼之象與

實脾利水之中不用守藥加微苦兼入血分

雲苓塊 連皮五錢

猪苓 二錢

穀精草 三錢

蒼朮炭 一錢五分

白芍 一錢五分

南查炭 三錢

廣木香 三錢

黃芩 炒二錢

五穀蟲 三錢

炒銀花 二錢

歸鬚 一錢五分

橘皮炭 二錢

丹皮炭 二錢

廿五 便後仍有積垢兼血脈與舌苔唇口較昨日皆佳并喜眠食均好神氣亦

清爽痂落尙不艱難一以實脾為主兼敗毒宣絡

猪苓 三錢

茯苓塊 連皮歸鬚 二錢

赤芍 五分

廣木香 三錢

桃仁 一錢五分

南查炭 三錢

蟬退 去頭足 二錢

半夏 打碎 一錢 五穀蟲 三錢

青皮 二錢

銀花 炒 二錢

炒丹皮 二錢

廿六 便後垢膩兼血脾與小腸寒溼右脈仍大好在眠食俱佳與燥濕並治

代水 蓮中黃土 二兩

猪苓 二錢 廣木香 三錢

雲苓塊 五錢 歸鬚 一錢

川黃連 炒 六分 蒼朮炭 二錢 蟬退 去頭足 二錢

南查炭 二錢 桃仁 三錢

廿七 痘後餘毒不安大便中夾有血積紅滯小便白濁與宜絡清溼敗毒兼化

濁中清氣

雲苓皮 五錢

猪苓 二錢

黃芩 五分

蒼朮炭 一錢

澤瀉 二錢

白芍 一錢

晚蠶沙 一錢五分

桃仁 二錢

蟬退 去頭足 二錢

五穀蟲 一錢 銀花 炒 二錢

山連 炒 八分

吳氏醫案

痘症

卷

南查炭二錢 煮兩大茶杯分三四次服

廿八 糞後瘀血未淨舌白滑苔脈滑甚

猪苓三錢 中黃土五錢 地榆炒炭二錢 澤瀉二錢

蒼朮炭二錢 歸身二錢 半夏二錢 雲苓皮三錢

蟬退去頭足 丹皮二錢 黃芩炭五錢 煮三杯分三次服

廿九 糞後之血已無惟舌厚白苔脈洪滑小便白濁濕氣尙重

雪苓連皮三錢 生薑仁三錢 黃芩炒二錢 猪苓三錢

蒼朮炭一錢五分 鱗鬚一錢五分 澤瀉三錢 晚蠶沙二錢

蟬退去頭足 半夏一錢五分 五穀蟲一錢五分 煮三杯分三次服

三十 於前方內加 竈中黃土五錢

初一 紅未見小便白濁仍然脈洪大

竈中黃土五錢 雲苓皮三錢 猪苓二錢 飛淨滑石三錢

晚蠶沙 三錢

澤瀉 二錢

生薑苡仁 三錢

五穀蟲 一錢五分

白通草 一錢

南布炭 一錢五分

黃柏炭 一錢 煮三小杯分三四次服

九月廿八日 色女六個

周身淫毒又加痘瘡舌苔黃厚脈洪數之至又赤爛風弦甫經六月之孩船小載重恐難勝任勉與辛涼解肌收毒

連翹 三錢

茯苓皮 三錢 木通 一錢

銀花 三錢

茶菊花 一錢五分

桑葉 一錢五分

苦梗 一錢

人中黃 八分

薤白根 三錢

澤瀉 一錢

煮兩茶杯每服半酒杯

廿九日 險痘三天淫毒已多痘亦不少舌苔黃厚滿佈船小載重恐難勝任

銀花 三錢

紫地丁 三錢

冬桑葉 三錢

連翹 一錢五分

苦桔梗 一錢五分

茶菊花 二錢

黃芩 一錢

牛蒡子 一錢

人中黃 一錢

丹皮 二錢

煮兩茶杯每服半酒杯 服至明早令完

三十日 於前方內加

細生地 二錢

十月初一日 險痘四天色太艱血熱也眼未封大者頂陷氣亦不旺外有涇瘡餘有

原案與犀角地黃湯法

犀角一錢五分

細生地五錢

白芍炒一錢五分

銀花三錢

茶菊花二錢

黃芩八分

連翹二錢

炙甘草一錢

丹皮二錢

煮兩茶杯分四五次服

初二日 險痘五天未周歲之孩只有七天限期便要收功五天後半日即係三歲

以後之七日忽爾泄瀉七八次大非所宜急與補托透絡

雲苓塊三錢

澤瀉一錢五分

肉果霜一錢五分

炒於朮二錢

白正一錢五分

廣皮炭一錢

廣木香一錢

木通八分

煮兩茶杯頻服以瀉止爲度

初三日 險痘六天業已上漿但因泄瀉之後頂平有發癰之象急宜實表內托

生綿薑五錢

半夏二錢

肉果霜一錢五分

雲苓塊三錢

防風 二錢 廣木香 八分 炒於朮 二錢 白芷 三錢

煮兩茶杯分四五次服

初四 險痘七天漿未足而泄瀉發癰喉啞聲嘶必得瀉止漿足方妙

生綿耆 五錢 於朮 炒三錢 薑半夏 三錢 茯苓塊 連皮三錢

防風 二錢 肉果霜 五分 苦桔梗 三錢 白芷 二錢

廣皮炭 二錢 廣木香 五分 煮三杯自服一半乳母服一半

初五 八天於前方內肉果霜加至二錢仍服一帖

初六 九天業已收痂溼瘡所生之痘尚有餘漿大便仍多猶有癰象

生綿耆 三錢 半夏 三錢 肉果霜 一錢 炒於朮 二錢

防風 二錢 廣木香 一錢 雲苔地 三錢 白芷 二錢

五穀蟲 二錢 苦桔梗 二錢 煮兩大杯頻頻服

初七 十天業已結痂大便猶澇而頻與寶脾利水法



雲苓塊 三錢

於朮 二錢

肉果霜 去淨油 一錢

穀精草 三錢

薏仁 五錢

五穀蟲 一錢 廣木香 一錢

煮兩大杯緩緩服 服至明 日令完

初八日 於前方內去半夏減肉果霜四分

初九日 十二天大便通

穀精草 三錢

雲苓 二錢

五穀蟲 一錢

肉果霜 一錢

於朮 二錢

廣皮炭 一錢 廣木香 一錢

蟬退 去頭足 一錢

煮兩杯分二三服

初十日 十三天痘前本溼瘡赤爛風法溼瘡隨痘已落惟眼邊赤爛雖較前勢減

而未愈微有羞明之象

雲苓皮 三錢

連翹 不去心 一錢 草決明 二錢

生薏仁 三錢

銀花 一錢

冬桑葉 一錢 穀精草 二錢

澤瀉 二錢

十一日 十四天於前方內加

茶菊花 一錢

日十五天眼皮之腫較昨已消其半服亦能開仍用辛涼以清餘熱

雲苓皮 三錢

連翹 一錢五分

草決明 二錢

生薏仁 三錢

銀花 一錢五分

五穀蟲 一錢

穀精草 二錢

桑葉 一錢

煮兩杯分數次服以腫消爲度

九月初二日 色二身熱痲癰脹數自汗耳冷脚冷唇冷有風溫欲痘之象大便頻仍

亦風邪也辛甘化風爲宜

連翹 一錢五分

苦桔梗 一錢

丹皮 五分

銀花 一錢五分

鉤藤鈎 一錢

甘草 生五分

麥冬 八分

茶菊花 一錢

日初三 痲癰之後業已見點泄瀉嘔惡太重裏症重於表症脈滑甚

連翹 三錢

苦桔梗 二錢

黃芩 二錢

銀花 三錢

粉丹皮 三錢

牡蠣 五錢

煮兩杯頻服

日初四 二天根羈色白泄瀉咳嗽乳食有不化之形初起之經表雖熱現在熱已

退裏虛可知雖不敢峻補亦不可再涼

雲苓塊

連皮三錢

廣木香

一錢

藏紅花

二錢

於朮炭

三錢

當歸炭

一錢

廣皮炭

一錢

薑半夏

二錢

煮三杯分三次服

初五

三天色白根鬆皮薄之虛寒痘昨日兩天即用兩補氣血今日色稍紅泄

生綿蒼

三錢

防風

二錢

藏紅花

二錢

茯苓塊

三錢

歸身

一錢五分

廣木香

一錢五分

於朮炭

三錢

廣皮

二錢

桂圓肉

二錢

薑半夏

二錢

初六

四天面色稍紅周身尚白仍宜溫托補血

生綿蒼

五錢

半夏

三錢

藏紅花

三錢

雲苓塊

三錢

防風

二錢

肉果霜

一錢

焦於朮

二錢

白芷

二錢

炒廣皮

一錢五分

廣木香

一錢五分

歸身

二錢

桂圓肉

二錢

煮三杯分四次服

初七 五天下半已紅頭面行漿於前方內去紅花滅皮果霜七分

初八 六天漿已足但皮薄易破看守勿懈爲要

生綿著 三錢 半夏 二錢 廣木香 一錢 茯苓塊 三錢

防風 二錢 炙甘草 五分 焦於朮 二錢 煮兩小杯分四次服

初九 七天漿已收痂大便澀與實脾利水兼之補氣

焦於朮 二錢 雲苓 三錢 五穀蟲 一錢 廣皮炭 一錢

薏仁 三錢 煮一大杯分二次服

初十 八天大便仍澀與實脾利水兼之化氣

雲苓塊 三錢 薏仁 三錢 五穀蟲 二錢 焦於朮 三錢

彈退 去頭足 一錢 廣皮炭 一錢 切忌發物生冷

十一 九天於前方內加 晚蠶沙 二錢

日二十天實脾利水

雲苓塊 二錢

彈退 去頭足 一錢 晚露沙 一錢

焦於朮 二錢

通草 七分

五穀蟲 一錢 生慈仁 二錢

九月廿六日 奕 痘瘡見點一日面色青暗陽部白陰部紅額以輕而白頰甚重而

紅兼之三五成羣逆發瘡窠不少實係逆症勉與活血羅毒鬆肌透絡令其易出再商

紫地丁 二錢

連翹 五錢

藏紅花 三錢

苦桔梗 五錢

銀花 五錢

荊芥穗 三錢

牛蒡子 三錢

薄荷 二錢

南查炭 三錢

桃仁泥 三錢 歸尾 三錢

人中黃 二錢

煮成三茶杯和入豬尾膏加入大梅冰片一分每次服一黃酒杯愈多愈妙

日廿七 逆痘二天陽部不發陰部稍有起色陽部之陽額也見點若有若無陽部

之陰額也甚為顯透其為毒鬱不發可知周身根鬆皮薄扁潤色暗其為

氣虛又可知矣用當生發之際含握毒活血鬆肌皆外道也扶過六天至七天能用補托方妙

紫地丁 三錢 銀花 五錢 荆芥穗 三錢 苦桔梗 三錢

白芷 二錢 南查炭 三錢 南紅花 三錢 防風 二錢

人中黃 二錢 桃仁泥 三錢 歸鬚 三錢

煮三杯分四次服仍和猪尾膏加入梅冰片五釐

廿八 三天逆痘有漸順之機夜卧安靜飲食尚可其佳處但潰簇太多頂平

根鬆漏漏不起今日議減敗毒加以提頂令其起脹預護將來之毒

連翹 二錢 苦桔梗 三錢 紅花 三錢 芥穗 三錢

南查炭 三錢 川芎 一錢 全歸 三錢 人中黃 五分

煮三杯加入猪尾膏頻頻服

廿九 四天漸有起色但根鬆頂平扁潤太多必得鼓立方妙

吳氏醫案 痘症

銀花 五錢

苦桔梗 三錢 紅花 三錢

連翹 三錢 不去心

穿山甲 二錢 全歸 二錢

防風 二錢

廣木香 八分

川芎 六分

白芷 三錢

人中黃 二錢

廣皮 炒炭 一錢

煮三杯分三次服

三十日 五天雖已起脹究竟頂平根鬆顏色灰白水泡亦多大便頻而澹口渴且

與提頂敗毒

銀花 五錢

苦桔梗 三錢 南紅花 二錢

連翹 三錢

穿山甲 二錢

白芷 三錢

防風 二錢

人中黃 二錢

廣皮 炒炭 一錢 五錢

煮三茶杯頻頻緩服服至明日午前令完

十一月初

六天正在行禁之際大便澹泄睡卧安靜痘勢雖未塌陷較昨見改觀

顏色雖未灰白而暗淡根鬆頂陷兼有網紋正合大虛少毒之象急與木

香散法令泄止方妙

生綿薯 五錢

人參 一錢

肉果霜 去淨油 三錢

靈苓塊 五錢

防風 三錢

詞子肉 二錢 炒於朮 三錢

白芷 三錢

廣木香 三錢

藟半夏 三錢 廣皮 三錢

炙甘草 三錢

濃煎三大茶杯不時煩服

丁亥正月 初四日

汪歲痘三天損簇四五處雖不過多究竟毒退與擬毒鬆肌爲安但

痘形扁潤不發氣虛之苗扶過七朝必須補托方好上漿

紫地丁 二錢

銀花 五錢

南紅花 二錢

苦桔梗 三錢

蓮翹 三錢

生甘草 一錢

牛蒡子 三錢

芥穗 二錢

豬尾膏 三匙

南查炭 二錢 全歸 二錢

初五

四天痘已佈齊神氣亦清無煩躁之象唇舌不絳是其佳處但額上色淡

與面頤四肢亦過淡形勢間有扁潤氣虛之徵今日大便已行不乾火毒有限辛涼只須輕用七日後必須補托



連翹 三錢

苦桔梗 三錢 川芎 四錢

銀花 一錢五分

南紅花 二錢

生歸 二錢

芥穗 一錢

生甘草 一錢

天中 二錢

煮三小杯分三次服

初六

五天形體漸潤而色鮮明已有起脹之勢惟足微冷氣虛之微七朝必須補托方可無足

連翹 三錢

苦桔梗 三錢 白芷 一錢

銀花 三錢

南紅花 二錢

甘草 二錢

防風 一錢

炒廣皮 二錢

煮兩杯分二次服

明日如再便澀可加廣木香

初七

六天於前方內銀花甘草俱減至一錢五分連翹減至二錢加

廣木香 二錢

初八

七天頭面雖有行漿之勢但色稍暗而足冷古謂頭溫足冷便作虛看議溫托法以助其漿

人參 一錢

生綿膏 六錢 白芷 二錢

桂枝 五分

廣木香 二錢

廣皮 三錢

防風 二錢

炙甘草 一錢 五分

煮三杯分三次服

初九

八天漿未足而大便溲加宣絡塞便即於前方內加

茯苓 三錢

肉果霜 二錢

訶子肉 二錢

於朮 炒炭一錢 五分

初十

九天頭面業已回瘧腿足漿尚未足雖溫而不熱猶宜輕輕托之

人參 八分

生綿膏 三錢

白芷 一錢 五分

於朮 炒二錢

肉果霜 一錢 五分

廣皮 一錢 五分

雲苓 三錢

廣木香 一錢

甘草 一錢

防風 一錢

煮二小杯分三次服

十一

十天業已收瘧足溫大便乾而唇赤與辛涼助結瘧兼解餘毒

連翹 三錢

五穀蟲 三錢

麥冬 不去心 三錢

銀花 二錢

晚蠶沙 二錢

甘草 一錢

茯苓 連皮 三錢

日十二 十一 天唇赤較昨已退大便乾去茯苓

戊子正月 汪三見點即多攢簇熱重可知且與辛涼擺毒解肌台其易出如明

日煩錄太多再攻未遲

紫地丁 三錢 連翹 三錢 荊芥穗 一錢五分 苦桔梗 三錢

銀花 三錢 冬桑葉 三錢 牛蒡子 三錢 薄荷 一錢

人中黃 一錢 豬尾膏 三匙加梅 煮三小杯分三次服 明日午

日廿七 二天攢簇太多必須擺毒鬆肌方妙

紫地丁 一錢五分 連翹 三錢 南查肉 三錢 苦桔梗 三錢

銀花 三錢 歸橫額 二錢 牛蒡子 三錢 芥穗 二錢

人中黃 一錢 豬尾膏 三匙 蘆根 四錢

日廿八 三天色重大便乾燥小便短而白濁溼重可知不可用大黃

細生地 三錢 紫地丁 二錢 草薢 三錢 連翹 三錢

苦桔梗 三錢

丹皮 三錢

銀花 三錢

牛蒡子 三錢

全歸 一錢五分

元參 二錢

人中黃 一錢

煮三小杯分三次服

廿九 四天色艷大便微溏小便已長頂未全起於前方內去濁下稍加提頂

細生地 三錢

苦桔梗 三錢 防風 一錢

白芍 二錢

紫地下 一錢五分

白芷 一錢

連翹 三錢

人中黃 三錢

丹皮 三錢

銀花 三錢

煮三小杯分三四次服

三十 五天大便溏小便白濁

連翹 三錢

雲苓塊 三錢

白芷 二錢

銀花 一錢五分

廣木香 一錢五分

廣皮 二錢

防風 二錢

白茅根 三錢

二月初 六天大便稀溏小便白濁

雲苓塊 三錢

澤瀉 三錢

生薏仁 三錢

於朮炭 二錢

防風 一錢五分

廣皮炭 一錢

廣木香 二錢

白芷 一錢

煮二杯分二次服

初二天大便泄瀉於前方內去防風白芷澤瀉加肉果霜 訶子

己丑十月多十個 周歲以內身熱三日時時惡寒上令餘火太甚現在冬寒司

令本係寒熱交加之際於茲發痘最爲氣分阻遏身面隱隱有點背腰尤顯先宜辛涼透表使外感連清

連翹一錢

苦桔梗一錢 橋紅一錢

銀花一錢五分

荊芥穗一錢五分

生薑三片

薄荷一錢

人中黃三分

蘆根一錢

廿三二天神識安靜頭溫足冷大便秘澀形勢不振似乎虛寒一邊但面上顏色較身上甚淡未爲無毒氣虛不能透之外出耳總須順此機括方爲無慮姑與開提肺氣使易充長

慮姑與開提肺氣使易充長

苦桔梗一錢五分

銀花一錢五分

歸尾一錢

荊芥穗一錢

天虫 二錢

紅花 一錢

人中黃 五分

蟬退 去頭足 一錢

白芷 一錢

雞冠血 沖三小匙

廿四

重險痘三天兩腮潰爛面色淡於身即係毒聚陽位身太小形太弱既氣

虛而又毒重此其所以棘手也且與活血涼血敗毒擺毒令其易出再商

紫地丁 二錢

連翹 二錢

當歸尾 一錢

苦桔梗 二錢

銀花 二錢

荆芥穗 一錢 牛蒡子 一錢

犀角 一錢 五分

南紅花 一錢

猪尾膏 一大杯 丹皮 一錢

人中黃 一錢

廿五

重險痘四天按痘四日當齊茲頭面與身較昨日頗長但色太重足心尙

未見點爲可慮耳舌苔老黃毒不爲不重猶宜敗毒涼血

紫地丁 二錢

犀角 五分

歸橫鬚 一錢

苦桔梗 二錢

連翹 二錢

南紅花 一錢 荆芥穗 一錢 五分

銀花 二錢

人中黃 一錢

猪尾膏 一大杯 丹皮 一錢 五分

廣皮炭 二錢

廿六 五天色漸淡神清大便溏

於朮

一錢

雲苓塊

一錢

白芷

一錢

防風

一錢

廣木香

一錢

廣皮

二錢

川芎

七分

高麗參

八分

煮一大茶杯分三次服

廿七

六天色淡便頻與異功法

雲苓塊

一錢

人參

一錢

肉果霜

一錢

炒於朮

一錢

白芷

一錢

廣橘皮

一錢

蘆半夏

一錢

防風

八分

炙甘草

五分

廣木香

一錢

生薑

二片

黑大棗

去核一枚

訶子肉

八分

煮一大茶杯分三次服

廿八

七天正屈行漿之際不宜四肢俱冷急宜溫補

雲苓塊

一錢

人參

一錢

訶子肉

一錢

炒於朮

一錢

白芷

一錢

肉果霜

一錢

蘆半夏

一錢

防風

一錢

公丁香 五分

廣木香 一錢 廣皮 一錢 五分

炙甘草 八分

濃煎一大茶杯半分四次服

廿九 八天色白皮薄之孩兩太陰必虛易于泄瀉當與實脾

雲苓塊 一錢 五分

人參 一錢 廣木香 一錢 炒於朮 一錢

廣皮 一錢 五分

炙甘草 八分 煮一大茶杯分三四次服

己丑十月 舒歲喜痘三天形小蜜碎此毒火過甚以歸宗法主之然余素不諳

此科仍須高明

大黃 一錢 五分

生梔子 二錢 厚樸 一錢

生地 三錢

小枳實 一錢

知母 一錢 五分 麥冬 三錢

炙甘草 一錢

蘆根 三把

元參 二錢

煮一杯分兩次服 此方文先生所定

廿二 四天蟬窠遊蠶是毒重也足冷頂平扁潤無輪腹痛是氣虛也既毒重而

又氣虛兩難兼顧勉與敗毒鬆肌活血



連翹 三錢

紫地丁 三錢 南查 炒炭 三錢

銀花 三錢

苦桔梗 三錢

全歸 三錢 白芷 二錢

大力子 二錢

廣皮 三錢

紅花 三錢 人中黃 一錢五分

蘆根 三錢

皂針 一錢五分

猪尾膏 一酒杯 加入麝香 五厘 研細

十三 五天氣虛毒重之痘昨與活血敗毒鬆肌今日大有起色兩足已溫血色

已活夢語似謔語包絡中之熱也以紫雪丹清之

苦桔梗 三錢

紫地丁 三錢 白芷 二錢

銀花 五錢

大力子 三錢

南查 二錢 連翹 三錢

人中黃 三錢

蘆根 五錢

防風 二錢

外紫雪丹一錢分二次溫開水送

十四 六天毒已漸化夢語已除大涼大熱之品皆在所忌於和中安表之中稍

加托漿

銀花 三錢

生肌膏 三錢 廣皮 三錢

防風 三錢

蘇半夏二錢 甘草一錢 白芷二錢 苦桔梗二錢

蘆根二錢 煮兩杯分三次服

日十五 七天痘已故肥癰清色淡須與漸次補托必得漿濃滿足方妙

半夏三錢 生熟薏四錢 白芷三錢 全歸三錢

紅豆仁一錢五分 紅花一錢 防風三錢 炙甘草一錢

廣皮三錢 煮三杯分三四次服

日十六 八天業已行漿但空殼居多根猶有不紅者稍用溫托

防風二錢 生熟薏五錢 神炮炒三錢 白芷二錢

薑半夏三錢 廣皮三錢 青皮二錢 炙甘草三錢

蘆根三錢

日十七 九天漿有漸足之勢仍宜助漿蓋未足九天猶有空處也

生熟薏五錢 薑半夏三錢 白芷二錢 防風二錢

焦神麴 三錢  
廣皮 二錢  
青皮 二錢  
炙甘草 三錢

糯米 二錢

十八天此方缺

十九天業已收痂與辛涼化毒兼清溼熱

銀花 三錢  
生薏仁 四錢  
甘草 一錢  
連翹 二錢

穀精草 三錢  
虛根 三錢  
麥冬 三錢  
五穀蟲 三錢

己丑十月廿七日 明女 患重險痘二天攢簇細碎頂平諳語色淡既毒重而又氣虛且

與攪毒鬆肌

苦桔梗 三錢  
連翹 三錢  
紅花 三錢  
南查灰 五錢

銀花 三錢  
杏仁 二錢  
牛蒡子 三錢  
薄荷 三錢

全歸 二錢  
人中黃 一錢  
芥穗 三錢  
蘆根 三錢

猪尾膏 一酒杯  
六厘研細沖  
煮三杯分四次服

外紫雪丹二錢分四包每包五分今日分服兩包明日再服兩包

廿八 重險痘三天大便閉毒過不發與必勝湯法餘有原案

生大黃酒炒半錢 銀花 五錢 南紅花 三錢 紫花地丁 五錢

元參 三錢 苦桔梗 三錢 南山查 五錢 歸尾 二錢

牛蒡子 二錢 桃仁泥 三錢 天虫 二錢 人中黃 一錢五分

豬尾膏 一酒杯加入香六厘 細沖

煮四大茶杯分五六次服服至明日午刻令完

廿九 重險痘四天昨用大黃五錢大便未通竝小便全無唇腫渴甚仍用必勝

法兩解氣血之毒餘有原案

生石膏 四兩 元參 五錢 桃仁泥 三錢 生大黃 一兩

銀花 五錢 苦桔梗 三錢 紫花地丁 五錢 歸尾 三錢

牛蒡子 三錢 豬尾膏 一酒杯 天虫 三錢 人中黃 一錢

煮四茶杯分四次服

十一月初一日重險痘五天昨日用大黃石膏大便已暢周一晝夜小便止一次噎咳肺氣之熱可知形色較昨日頗覺起發頭面已有行漿之勢仍宜敗毒涼肺護喉兼之提頂

元參 五錢

生石膏 二兩

黃芩 三錢

銀花 五錢

紫花地丁 三錢

紅花 二錢

苦梗 三錢

牛蒡子 三錢

白芍 二錢

防風 二錢

人中黃 二錢

皂針 一錢

天虫 二錢

煮三大茶杯分三次服

初二日六天業已行漿頭面脊背甚可四肢平頂稍覺灰白似當補托但痘太多

毒太重身太熱且與清毒護喉明日七朝再托未遲寒涼似不可重耳

細生地 三錢

苦桔梗 三錢

銀花 三錢

元參 三錢

藏紅花 三錢

皂針 三錢

防風 三錢

牛蒡子 三錢

白芷 三錢

天虫 三錢

人中黃 二錢

黃芩 二錢

初三 七天漿行五六腸鳴下氣恐有泄瀉之患急宜溫托

人參 一錢

雲苓塊 三錢 廣皮 二錢

黃耆 六錢

薑半夏 三錢

甘草 二錢

於朮 三錢

肉果霜 三錢

生薑 三片

白芷 三錢

訶子肉 三錢

大棗 二枚

防風 二錢

廣木香 三錢

煮四杯烤三杯分四五次服

初四 八天漿行至足顏色鮮明飽綻可以成功再照前方一帖分八九兩朝溫

煎緩緩服

初六 十天業已結痂惟脚腫與實脾利水法

雲苓塊 三錢

銀花 五錢

穀精草 四錢

於白朮 一錢五分

連翹 三錢

五穀蟲 三錢

生慈仁 五錢

煮三杯分三次服

初七 痘十一天仍用前方再服一帖

己丑十月廿九日 富使女十歲 痘因溫毒而發喉痛身熱鼻衄嘔惡苗出扁濶根鬆多不

可解勉與先清溫毒

生大黃酒炒半斤 苦桔梗 五錢 芥穗 三錢 連翹 二錢

牛蒡子 五錢 丹皮 三錢 銀花 三錢 人中黃 三錢

射干 三錢 元參 五錢 側柏炭 三錢 天虫 三錢

薄荷 三錢 白茅根 五錢 馬勃 一錢五分

煮六杯分六次服服至明日午刻令完

十一月初一日 重險痘二天苗暗紫而根扁濶昨用大黃六錢仍然大渴便閉先以敗

毒通腑涼血立法

生石膏先煎八兩 四兩 銀花 五錢 荆芥穗 五錢 生大黃酒炒半斤 一兩

桃仁 五錢 紫草茸 三錢 苦桔梗 五錢 歸尾 三錢

人中黃 二錢 紫地丁 五錢 射干 三錢 白茅根 三錢

牛蒡子 五錢

煮五大茶杯分五次服

初二重險痘三天大便已見喉痛甚急清溫毒

紫花地丁 五錢

銀花 五錢 射干 三錢

苦桔梗 五錢

元參 五錢

天虫 三錢 牛蒡子 五錢

歸尾 五錢

蟬退 去頭足 二錢

人中黃 五錢 芥穗 三錢

馬勃 一錢

白茅根 三錢

煮五杯分五次服

初三重險痘四天頂平根鬆色重喉痛且與敗毒提頂

銀花 五錢

紫地丁 五錢 天虫 三錢

連翹 三錢

穿山甲 二錢

白芷 三錢 苦楝 三錢

牛蒡子 三錢

皂針 三錢

全歸 一錢 人中黃 一錢

煮三杯分三次服

己丑十一某男 色暗扁潤形體太弱氣虛之症以渴而煩躁故且與髮肌搽

毒



苦梗 三錢

生石膏 六錢 芥穗 八分

連翹 三錢

南查炭 一錢

紅花 八分

銀花 二錢

人中黃 一錢

蘆根 三錢

知母 炒一錢

煮二小杯分二次服

初一日

重險痘二天既氣虛而又毒重泄瀉舌絳煩躁汗多勉與涼血搃毒須避滑潤

生石膏 一兩

犀角 三錢

凌霄花 三錢

紫花地丁 五錢

丹皮 三錢

炒黃芩 二錢

金銀花 五錢

連翹 三錢

人中黃 一錢

苦桔梗 三錢

山連 酒炒一錢

白茅根 三錢

初三日

重險痘三天毒過不發正看似少傍看甚多身半以下甚顯而赤頭面甚暗而平即係毒聚陽位合之舌絳煩躁泄瀉勢非輕淺

紫花地丁 五錢

銀花 五錢

凌霄花 三錢

雲苓皮 三錢

犀角 三錢

炒山連 一錢

苦桔梗 三錢

丹皮 三錢

初四

重險兼逆痘四天毒熱陽位昨日大用涼血解毒今日大有起色頭面頗

長但攢簇太多根結頂平毒重氣虛雖當補托然必清出地界七日氣血

用事再商舌絳不渴邪歸血分故不用石膏而加甘潤

一紫花地丁 五錢 犀角 三錢 金銀花 五錢 細生地 五錢

丹皮 四錢 苦桔梗 三錢 凌霄花 三錢 麥冬 不去心 三錢

人中黃 二錢 豬尾膏 一酒 桑葉 三錢 白茅根 三錢

初五

重險痘五天昨用涼血敗毒甘潤今日津液頗回痘亦充長但平頂尚多

大便頻瀉議於涼血敗毒之中少加提頂理脾去甘潤扶過明日至七朝

能用補托可望有成

苦梗 三錢 紫地丁 三錢 丹皮 三錢 銀花 三錢

雲苓皮 三錢 白芷 二錢 犀角 三錢 廣木香 一錢

皂針二錢

防風二錢

人中黃一錢

煮三杯分三四次服

初六

痘六天已有行漿之勢大便仍頻可少與補托兼之實脾

人參五錢

雲苓塊三錢 防風二錢

絲蓆五錢

廣木香一錢

白芷二錢

於朮一錢

炙甘草二錢

煮三杯分三次服

初七

七天漿雖已行但色淡皮薄大便滯氣虛之至重用補托漿雖不能十分

滿足必須八成方妙男子故也

炙絲蓆八錢

蓮參二錢

廣木香二錢

雲苓塊三錢

於朮三錢

肉果霜三錢 薑半夏三錢

白芷三錢

炙甘草三錢

訶子肉三錢 廣皮三錢

濃煎四大茶杯一時服半杯

初八

八天漿行五六形勢鼓粒而漿色不黃微帶灰色四肢空殼尚多仍須重

用溫托成功在此一舉

炙絲耆 一兩 人參 三錢 肉果霜 三錢 雲苓塊 三錢

於朮 炒三錢 訶子肉 煨三錢 薑半夏 三錢 白芷 五錢

廣木香 三錢 公丁香 五分 廣皮 五錢 炙甘草 三錢

濃煎四杯分四次服

初九 九天漿未足而色灰雖不咬牙而微有寒戰雖不泄瀉而大便頻澀與十

四味異功散法減其大者之分量可也

茯苓塊 三錢 人參 五錢 肉果霜 研細三錢 薑半夏 三錢

防風 三錢 訶子肉 三錢 白朮 炒三錢 白芷 三錢

廣木香 三錢 熟附子 一錢 肉桂 一錢 炙甘草 二錢

公丁香 五分 廣皮 三錢 煮三杯分四五次服

初十 十天漿雖不足而灰色頗變間有黃者大便頻澀仍舊虛寒之象可憐仍

須補托

雲苓塊 三錢 人參 三錢 肉果霜 三錢 土於朮 三錢

白芷 三錢 訶子肉 三錢 廣木香 三錢 防風 二錢

炙甘草 二錢 益半夏 三錢 廣皮 三錢 煮三大杯 烤二杯 分六次服

十一 一天業已收癰聚未足大便太滑十四朝猶係險關仍不得離補托收  
滿法

生慧仁 三錢 人參 一錢 肉果霜 一錢 雲苓塊 一錢

於朮 一錢 煨訶子 一錢 益半夏 二錢 廣皮 一錢

炙甘草 一錢 廣木香 一錢 煮兩茶杯 分四次服

十二 十二天仍照前方再服一帖

十三 十三天再服一帖

十四 十四天於前方內去人參肉果訶子雲苓再服一帖

己丑十一月十七日張氏歲重險痘二天雁行扁潤胸痞嘔惡頭痛口渴先解溫毒爲

要

先煎水

生石膏 四兩

連翹 五錢

黃芩 三錢

苦桔梗 五錢

銀花 五錢

知母 三錢

薄荷 三錢

牛蒡子 五錢

蘆根 三錢

人中黃 二錢

芥穗 三錢

初四

重險痘三天昨因雁行扁潤胸痞嘔惡大用石膏今日症退形勢鼓粒牙

食 穎原純正不合前醫誤與發表甫三日癰不可解喉痛溫毒未盡未可大

元參 五錢

生石膏 二兩

黃芩 三錢

防風 三錢

苦桔梗 五錢

白芷 三錢

知母 二錢

牛蒡子 三錢

桑葉 三錢

天虫 三錢

人中黃 二錢

煮三杯分三次服

初五

重險痘四天痘之形色頗佳但溫毒之喉痛未止又加性急動肝則更痛

吳氏醫案

痘症

旨

矣誤傷表氣之發瘥恐破損致傷此其所以為險也

元參 五錢

烏犀角 三錢 射干 三錢

知母 五錢

苦桔梗 五錢

桑葉 三錢 防風 三錢

牛蒡子 五錢

蘆根 五錢

白芷 三錢 人中黃 二錢

煮三杯分三次服

初六

五天喉痛減而未除已有行漿之勢但有二三成頂平者少用托法

元參 三錢

生鮮薑 五錢 皂針 一錢五分

防風 三錢

牛蒡子 三錢

蘆根 三錢 白芷 三錢

金銀花 三錢

初七

六天頭面漿已有七八肢尚未足大便未見口乾

元參 五錢

生鮮薑 五錢 白芷 三錢

麥冬 四錢 不去心

次生地 四錢

蘆根 三錢 防風 三錢

金銀花 三錢

糯米 一握

初八

七天頭面漿足口乾熱重大便結不必再為托漿與甘瀉法以配陽之有

餘

元參 六錢

次生地 五錢 甘草 二錢

麥冬 不去心 四錢

黃芩炭 二錢

藕根 三錢 銀花 三錢

初九 八天漿已足眼未封多淚不爽防餘毒傷目兼之辛涼結痂

元參 五錢

穀精草 六錢 黃芩 二錢

銀花 三錢

五穀蟲 三錢

桑葉 三錢 丹皮 三錢

生甘草 一錢五分

蘆根 三錢

初十 九天辛涼結痂目未封兼清心膽而經之餘毒

薏仁 五錢

穀精草 五錢 黃芩 三錢

連翹 三錢

茶菊花 三錢

丹皮 三錢 銀花 三錢

五穀蟲 三錢

桑葉 三錢

十一 十天目已愈有水泡未乾脈已不洪數與實脾利水

吳氏醫案

痘症

重



薏仁 五錢

雲苓塊 五錢  
於朮 二錢

連翹 三錢

五穀蟲 三錢

磨根 三錢  
銀花 三錢

煮三杯分三次服

己丑十一月  
月初三日 明女 二個

身熱三天見點有發痘之機微咳最忌發表恐虛表致痰  
蓋痘由少陰而發至太陽之位而上榮結痂以成全功無辜誅伐太陽是  
毀其成功之地且痘因溫熱之氣而發又最忌發汗與辛涼法

銀花 三錢

苦桔梗 三錢  
芥穗 一錢

連翹 二錢

牛蒡子 三錢

天虫 二錢  
杏仁 一錢五分

生甘草 一錢

蘆根 三錢

薄荷 六分  
煮兩茶杯分四次服

初四

逆痘二天面色青白身體腫癰見點似出不出毒過不發呻吟晝夜防悶  
咳嗽有汗

苦梗 三錢

穿山甲 三錢  
芥穗 二錢

銀花 五錢

南查炭 五錢

天虫 二錢  
連翹 三錢

牛蒡子 三錢

地龍 二錢

薄荷 一錢

人中黃 一錢

煎三杯分五六次服

外紫雪丹二錢分四包先服一包晚間服一包明晨再服一包與湯藥

間服

初五

重險痘三天面色稍轉呻吟咳嗽俱減身腰點亦明亮惟頭面尚不顯彰  
毒過不發之故

苦梗 三錢

穿山甲 二錢

川芎 一錢五分

銀花 五錢

全當歸 二錢

天竺 三錢

薄荷 一錢

牛蒡子 三錢

地龍 二錢

芥穗 二錢

人中黃 一錢五分

初六

重險痘四天痘形起立惟色淡四肢與身不熱不住哭吐腹不和也

苦桔梗 三錢

白芷 二錢

南查炭 三錢

炒神麴 三錢

川芎 一錢

藏紅花 二錢

全當歸 一錢五分

廣皮 二錢

人中黃 一錢

初七 重險痘五天已放肥者皆破損可慮之至四肢不熱與溫托法

生絲蓍 五錢 防風 二錢 廣木香 一錢 薑半夏 三錢

白芷 二錢 炙甘草 二錢 藏紅花 三錢 廣皮 三錢

煮三小杯分四次服

初八 重險痘六天色暗頂平身不熱雖有行漿之勢但清而不暢須急與補托

人參 一錢 生絲蓍 六錢 紅花 三錢 半夏 二錢

廣木香 二錢 廣皮 三錢 防風 二錢 熟附子 八分

生薑 三錢 白芷 二錢 炙甘草 二錢 大肉 二枚

煮三杯烤成一杯分三四次服三更令完

壬辰九月 劉氏三朝三五成羣之痘且有疊錢二三塊豈善證哉且與鬆肌達

表活血搗毒

苦桔梗 一錢 連翹 三錢 南山楂 二錢 全當歸 一錢

銀花 三錢

炒黃芩 一錢

荆芥穗 八分

薄荷 六分

紫草茸 一錢

牛蒡子 一錢

殭蠶 一錢

人中黃 一錢

猪尾膏

研入土土梅冰

煮三小杯分三次服

甘八

酒天於原方內加石痔生

一兩

生大黃

酒炒

五錢

甘九

五天色試銀絲頂平與敗毒活血提頂於前方內加

白芷 二錢

防風 二錢

皂針 二錢

紅花 三錢

初九日

七天已自行發之勢但色淡間有根鬆一味托補使藥行飽滿諸毒隨

漿而泄

洋參 二錢

生絲蓄 二錢

白芷 二錢

銀花 三錢

藏紅花 一錢

全歸 一錢

防風 二錢

炙甘草 三錢

煮三杯分三四次服

初三日

九天漿已足而口渴甚火未退與辛涼助結痂之用

吳氏醫案

痘症

七

連翹 三錢

生石膏 一兩 黃芩 二錢

銀花 三錢

細生地 五錢

桑葉 三錢

麥冬 三錢 不去心

生甘草 一錢

煮三杯分三次服口渴止去石膏

初五日

十一天痲已落而熱未退與辛涼清熱加納氣歸原法

次生地 三錢

地骨皮 三錢 黃芩 二錢

銀花 三錢

五穀 一錢五分

桑葉 三錢 連翹 二錢

生甘草 一錢

煮三杯分三次服

壬辰十一日

孟三頭面腰間有粒身熱防痘宜辛涼最忌發汗

連翹 三錢

苦桔梗 二錢 元參 二錢

銀花 三錢

牛蒡子 三錢

芥穗 一錢 薄荷 一錢五分

南查炭 二錢

甘草 一錢

煮三杯分三次服

廿二日 仍服原方一帖

日廿三 險痘二天臉面獨重根鬆頂平地界不清

紫花地丁 三錢 連翹 三錢 東山查 三錢 細生地 三錢

銀花 三錢 粉丹皮 三錢 苦桔梗 二錢 天虫 二錢

荆芥穗 一錢五分 牛蒡子 二錢 蘆根 三錢 人中黃 一錢五分

猪尾膏 半酒杯加入 煮三杯分三次服

日廿四 險痘三天臉面之板滯已化活潤不合兩腿鼠跡不大便須微攻之

紫花地丁 四錢 銀花 五錢 苦桔梗 三錢 生大黃 三錢

連翹 三錢 荆芥穗 二錢 牛蒡子 三錢 天虫 二錢

人中黃 二錢 猪尾膏 一酒杯加入 煮三杯分三次服

日廿五 重險痘四天頭面根鬆頂平背與兩腿蟾窠鼠跡太多有殼薄漿清之虞

雖不大便不敢峻攻以有疔痕故也且與提頂拔毒

紫花地丁 五錢 苦梗 三錢 白芷 一錢 牛蒡子 三錢

銀花 五錢

皂針 一錢

白茅根 二錢

連翹 三錢

天虫 三錢

人中黃 二錢 防風 二錢

蘆根 三錢

猪尾膏 一酒杯加入  
梅冰片五厘

煮三杯分三次服

廿六

險痘五天昨用提頂今日頂起者大半根亦漸緊業有行漿之勢大便昨

日已通茲與領清氣以行漿

連翹 三錢

苦桔梗 三錢 丹皮 二錢

銀花 三錢

牛蒡子 三錢

白芷 二錢 防風 二錢

人中黃 一錢五分

天虫 二錢

橘皮 二錢 白茅根 三錢

蘆根 三錢

煮三杯分三次服

廿七

痘六天業已氣血用事之際當與托漿

銀花 三錢

生縣著 五錢 白芷 二錢

防風 二錢

白茅根 三錢

蘆根 三錢 丹皮 二錢

炙甘草 一錢五分

煮三小杯分三次服

日廿八痘七天仍須托漿

生絲蓆 五錢 銀花 三錢 白芷 三錢 細生地 五錢

防風 三錢 甘草 炙一錢 白茅根 五錢 煮三小杯分三次服

日廿九痘八天漿不甚足仍須托之於原方內去生地銀花白茅根加

人參 橘皮

日三十痘九天與辛涼結痂於原方內加 五穀蟲 穀精草

壬辰十二月 福文 啟身熱色絳識語癡狂先與紫雪丹二錢分二次服以開心

包

日廿七重險痘一天心經報痘識語癡狂得香開少定其見點已有連珠之形恐

將來攢簇必多唇舌色絳心火太急陽亢不寐又恐八九朝癰塌急宜預

防或可避也



暹羅犀角 五錢 銀花 五錢 桃仁泥 三錢 紫花地丁 五錢

連翹 三錢 荆芥穗 三錢 細生地 五錢 丹皮 三錢

苦桔梗 三錢 蔞葶花 三錢 薄荷 一錢 歸橫鬚 一錢

川連 一錢 人中黃 二錢 豬尾膏 一酒杯加入 梅冰片五厘

煮三大茶杯分五六次服得寐

廿七日 神識不清仍服紫雪丹一錢

廿八日 照原方再服一帖

廿九日 重險逆痘三天連珠雁行太多急宜搗毒色重宜涼血便澹宜堅陰

暹羅犀角 四錢 銀花 五錢 苦桔梗 三錢 紫花地丁 五錢

連翹 五錢 蔞葶花 三錢 細生地 三錢 川連 酒炒 二錢

牛蒡子 三錢 豬尾膏 一酒杯 天虫 二錢 人中黃 二錢

煮三杯分三次服

三十 照原方一帖分二日服

癸巳正月 痘六天將至氣血用事業已行漿變逆為順是其佳處但頭面雖起

週身色白火反不足與溫托法

銀花 三錢 生黃耆 五錢 白芷 三錢 防風 三錢

炙甘草 三錢 橘皮 五錢 煮三杯分三次服

初四 九天頂下已有結痂之勢大便秘澀而頻與實脾利水以收痂少加敗毒

生薏仁 五錢 銀花 三錢 穀精草 三錢 雲苓塊 三錢

蘆根 三錢 五穀蟲 三錢 於朮炭 二錢 煮三杯分三次服 三帖

瘰癧 太陽所至為瘰癧

癸亥閏二月 甫六十日之幼孩瘰癧已廿餘日現在脈不數額上涼汗竝無外

感可知乃難藥亂投致傷脾胃故乳食有不化之形恐成柔瘰癧俗所謂慢脾風護中焦乃實土制風法又肝苦急食甘以緩之之義也

吳氏醫案

瘰癧 瘰癧

卒

生薏仁 五錢

肉果 煨一錢

明天麻 三錢

茯苓塊 五錢

乾薑 二錢

廣木香 八分

焦於朮 三錢

甘草 炙三錢

煨生薑 一片

甘瀾水五茶杯煮成兩茶杯小人服十之一二乳母服

十二八九道再煮一茶杯服如前法

三

赤子不赤而刮日兼青脈遲涼汗舌苔白滑而厚食物不化洞泄者必

中寒按厚必因於溼古所謂柔痙是也議從中治經謂有者求之無者求之此症全無風火之象純然虛寒乳中之溼不化土愈虛則肝中內風愈動若不崇土而惟肝是求恐日見窮促矣

生於朮 一錢

人參 四分

明天麻 一錢

焦白芍 一錢

肉果 煨五錢

生薏仁 一錢

廣木香 五分

甘草 炙一錢

黃皮炭 三分

陽

風溼相搏有汗爲柔痙形若反弓者病在太陽俯視目珠向下者病在陽

明以陽明爲目下綱也今久病爲雜藥困傷脾胃大便泄乳食不化爲溼多風少瘧時俯視多爲病在陽明故此症以脾胃爲主議補中益氣法溼溼下行內用風藥領邪外出

人參 三分

茯苓塊 三錢 山藥 一錢

桂枝 二分

甘草 炙五

焦白芍 二錢

葛根 二錢

白朮 一錢

生薏仁 一錢五分

初三日

寒瘧柔瘧昨用升陽益氣法從陽明提出太陽茲精神倍昔顏色生動舌上白苔化淨大便秘已實甚爲可喜但瘧家有灸瘡者難治

人參 三分

茯苓塊 一錢 薏仁 一錢

於朮 一錢

嫩桂枝 三分

葛根 二分

白芍 錢一

廣皮炭 二分

甘草 炙五

蓮子 三粒 去心不

初四日

瘧家自汗有灸瘡者難治刻下且保住脾胃從脾胃中土以條達四肢是久瘧一定之至理若緩治其瘧是速之也

茯苓塊 一錢

人參 三分

訶子肉 煨五分

焦於朮 八分

桂枝 二分

煨肉果 三分

生薑仁 一錢

廣皮 三分

炙甘草 八分

茅朮炭 六分

初五

症家重為苦寒所傷脾陽下陷又有灸痞其症萬萬不能即愈議護中陽

勿致虛脫為要非淺鮮錢仲陽陳文仲薛立齋葉天士之書者不知此義

茯苓塊 一錢

人參 四分

訶子肉 煨六分

炒於朮 一錢

桂枝 三分

廣皮炭 三分

煨肉果 六分

白芍 二錢

炙甘草 一錢五分

廣木香 四分

慧仁 一錢五分

濃煎

初七

脈仍不數大便猶滯但舌苔微黃神氣漸復不似前虛寒太甚之象宜退

剛藥少進柔藥繼經謂上守神粗守形兵法謂見可而進知難而退此之

謂也

人參 三分

茯苓塊 一錢

蓮子 整用一錢

於朮 炒一錢

炒白芍 一錢 廣皮 鹽水炒 四分 麥冬 米炒 一錢 炙甘草 七分

初九 諸症漸退神氣亦佳但舌上復起重濁之白苔乳溼之故暫停參藥且用疏補法

茯苓塊 一錢 麥冬 不去心 焦神麴 八分 生薏仁 一錢  
厚樸 五分 廣皮炭 五分 廣木香 四分 蓮子 一錢 整用

乙酉六月初三日 張十三 脈沉細而弱舌苔白滑幼童體厚純然溼邪致痙一年有餘

生薏仁 六錢 桂枝 三錢 川椒炭 三錢 雲苓皮 五錢  
廣皮 三錢 白蔻仁 一錢 蒼朮炭 三錢

初八 痙症發來漸稀效不更方

十六日 脈至沉至細至緩舌白滑甚溼氣太重故效而不愈於前方加枳滯而通補脾陽之草果調和營衛之桂枝白芍甘草 五帖

廿一日 痙症脈沉細至緩舌白滑甚溼氣太重與溫淡法發來漸稀未得除根於

前法內去剛燥加化痰

半夏 六錢

雲苓塊 五錢 廣皮 三錢

桂枝 四錢

益智仁 二錢

甘草 錢一 薏仁 五錢

炒白芍 三錢

薑汁 沖三

廿五 服前方四帖已效舌苔仍然白滑六脈陽微照前方再服四帖

廿九 前方已服四帖諸症皆安惟痰尚多再服四帖

六月初九 前方又服九帖瘧症止發一次甚輕已不嘔吐痰尚多脈甚小照前方

再服

瘧症

乙丑閏六 陳十五 病久陰傷已極骨瘦如柴又加卒然中暑中熱氣舌絳芒刺

唇乾液涸無怪乎瘧厥神昏十指蠕動危險之至以脈尚浮弦而孔勉與一面香開心包一丙大隊填陰兼鹹以止厥法先與紫雪丹二錢涼開水

和服共服六錢

犀角 五錢

羚羊角 三錢 白芍 五錢

鱉甲 五錢

細生地 二錢

阿膠 三錢 牡蠣 五錢

炙甘草 二錢

麻仁 二錢

濃煎緩服

廿八 神識未清間有譫語

犀角 五錢

直生地 八錢 麥冬 八錢 不去心

鱉甲 五錢

生白芍 五錢

麻仁 三錢 阿膠 三錢

炙甘草 六錢

七月初一日

邪少虛多用復脈已當但舌上黑苔未化宿糞未見兼加潤法

元參 二兩

直生地 八錢 麥冬 六錢 不去心

枳甲 六錢

生白芍 六錢

麻仁 五錢 犀角 五錢

炙甘草 三錢

阿膠 三錢

煮成三椀分三次服

初五服前藥五帖見宿糞若許黑苔已化但神識尚未十分清楚用三甲復脈

吳氏醫案

癰疽

全



湯加犀角卽於三甲復脈湯內加犀角四錢

初八 神識仍未清楚湯藥照前間服 牛黃丸 三九

乙丑九月 陳三 燥氣化火則熱舌黃脈數而厥法宜辛涼解肌切忌發表

銀花 八錢 羚羊角 三錢 黃芩 二錢 連翹 六錢

苦桔梗 六錢 丹皮 三錢 杏仁 四錢 牛蒡子 三錢

甘草 二錢 薄荷 二錢 共爲粗末分五包一時許服一包煎根湯

煎去渣服

十七 燥氣化火身壯熱渴甚於前方內去薄荷羚羊角牛蒡子丹皮加

煨石膏 生地 麥冬 炒知母

乙丑閏六月八日 未及歲之兒溫毒頭腫既癒且厥壯熱氣促脈極數大恐真

陰不勝陽邪先以普濟消毒飲宣毒外出必去升麻柴胡之直升少陽陽

明者加犀角羚羊角瀉心膽之熱

連翹六錢

苦桔梗三錢 薄荷二錢

銀花六錢

牛蒡子六錢

赤穗二錢 元參五錢

板藍根二錢

天虫三錢

馬勃三錢 人中黃二錢

其為粗末分八包一時許

服一包外以鮮荷葉一張煎湯代水加犀角 鎊四錢 羚羊角 鎊四錢

另包不必為末於前藥每包加犀角五分羚羊角五分同煎

六月初九日 吳三歲辰刻以跌撲驚後癰瘰至戌正始醒醒後身大熱口渴脈數舌無

苔用復脈湯六帖熱退脈靜又服二帖而安

尹十五歲 卒中暑風癰瘰口歪四肢抽掣頭微痛與清少陽膽絡法

羚羊角二錢 連翹二錢 粉丹皮一錢 苦桔梗一錢

銀花二錢 冬桑葉一錢 茶菊花二錢 薄荷八分

生甘草一錢 鉤藤鈎一錢 五帖全愈

百歲痘後餘邪入少陽陽明之絡但唇口與眼皮癰瘰致飲食不能合收每從

口張時隨即吐出四肢不掣與清二經之絡法

連翹二錢 細生地三錢 鈎藤一錢 銀花二錢

苦桔梗二錢 桑葉二錢 麥冬三錢 茶菊花二錢

生甘草一錢 丹皮二錢 刺蒺藜一錢

先服湯藥數帖後以三十帖作散每日早中晚三次各服二錢服至半

食積

乙酉七月十一日 金男三歲 幼孩子心熱舌苔厚而渴嘔吐食積也法當和胃而醒脾宜

降不宜升

藿香梗一錢 半夏二錢 廣皮炭一錢 焦神麩五錢

厚樸一錢五分 雞內金一錢 白豆蔻三錢 薏仁二錢

煨生薑三小片

十三日 熱退脈平以調理脾胃為主

茯苓塊 三錢

半夏 一錢

白扁豆 一錢

炒白朮 二錢

山藥 炒一錢

廣皮炭 六分 炒神麴 一錢

厚樸 六分

廿三日泄久脾虛將成滯下

焦白芍 一錢

茯苓 二錢

煨益智 五分

廣木香 八分

厚樸 二錢

雞內金 二錢

焦神麴 二錢

薏仁 三錢

廣皮炭 一錢五分

黃芩炭 八分

乙酉七月 初一日 陶二幼孩手心熱甚舌微黃身微熱體瘦神不足防成疳疾與疏補

中焦兼之消食

雲苓塊 三錢

薏仁 三錢

廣皮炭 一錢

炒神麴 一錢

厚樸 八分

雞內金 一錢

益智仁 七分

煮三小杯分三次服 而愈

丁亥七月 廿五日 孫九疳疾已久若不急講調理飲食則勢不可為矣用藥以疏補中

焦立法

藟半夏 三錢

雲 連皮 四錢

雞內金 炒二錢

益智仁 一錢五分

厚樸 二錢

南木 炭 一錢五分

廣皮 炒炭二錢

煮三小杯分三次服

丁未四月廿四日

脈大浮取時數脾虛食滯疳疾將成大便頻仍而腫腹大與溫

宣中焦法

雲苓皮 三錢

薏仁 四錢

益智仁 一錢五分

藟半夏 三錢

神麴 炒三錢

黃芽炭 一錢五分

廣皮 炒炭二錢

煮三小杯分三次服 三帖

廿八日

大便後見血乃小腸寒溼加黃土湯法於前方內加 附子 錢一

蒼朮炭 三錢

礬中黃土 四兩

再服三帖

殮泄

甲申六月十三日

章男 十一月 泄久傳 脾恐成柔瘕俗所謂慢脾風議疏補中焦

茯苓塊 三錢  
厚樸 一錢  
煨肉果 一錢  
炒薏仁 三錢  
蓮子 連皮去心 三錢  
炒扁豆 二錢  
廣木香 五分  
芡實 一錢  
廣皮炭 八分

十四 今日仍用通補而進之

茯苓塊 二錢  
人參 五分  
煨肉果 一錢  
炒薏仁 二錢  
半夏 二錢  
小茴香 一錢  
藿香梗 八分  
厚樸 八分  
焦范麩 八分  
廣木香 七分  
扁豆 炒三錢  
廣皮炭 八分

十六 疏補中焦業已見效仍不能外此法

茯苓塊 三錢  
人參 五分  
煨肉果 一錢  
薏苡仁 炒三錢  
於朮 一錢  
炒扁豆 三錢  
藿香梗 八分  
半夏 二錢  
廣皮炭 八分  
廣木香 八分  
厚樸 八分

十七 神氣聲音稍健皮熱亦覺和平大有起色但積虛非旦晚可充

茯苓塊 三錢

人參 五分

肉果霜 一錢五分

淮山藥 一錢五分

半夏 二錢

炒扁豆 二錢

廣木香 八分

蓮子 二錢

廣皮炭 一錢五分

十八 舌有黃苔小便色黃微有積背脾虛不運之故且暫停參藥加宣通法

茯苓塊 三錢

於朮 一錢

白薏仁 五分

生薏仁 三錢

半夏 二錢

雞內金 一錢

煨肉果 一錢

廣皮炭 八分

廣木香 七分

蓮子 二錢

十九 大便有不化之形思乳食為血肉有情應於疏補之中加消血肉積者

茯苓塊 三錢

薏仁 三錢

白薏仁 三分

煨肉果 一錢

厚樸 一錢五分

雞內金 一錢

南查肉 一錢

神麩 八分

廣皮炭 一錢

廣木香 七分

二十 脾虛大衰則食物有不化之形肝腎與衝脈伏寒怒甚則疝痛

製茅朮 一錢

茯苓 一錢

煨肉果 五分

小茴香 炒黑 二錢

薏仁 三錢

白蔻仁 五分

南查炭 五分

烏藥 八分

廣皮炭 八分

廣木香 一錢

青皮 六分

日 廿一 通補中下

茯苓塊 三錢

人參 三分

小茴香

炒黑 五分

煨肉果 一錢

薏仁 五分

白蔻仁 五分

廣木香 六分

蒼朮 製八分

南查炭 八分

張男 八個

泄瀉四五日暑邪深入下焦頭熱如火手冷如冰謂之暑厥厥瘦難

堪脈遲緊未必得愈姑立方以救之先與紫雪丹五分作三次服

桂枝木 一錢

猪苓 二錢

製蒼朮 一錢

茯苓塊 二錢

澤瀉 一錢

廣皮炭 七分

廣木香 七分

扁豆 一錢

又 暑有轉機然熱可畏也



乙酉八月十六日 孟 伏暑泄瀉加以停食欲瀉腹痛瀉後痛減防成滯下與五苓

散加消食脈弦細而緩

薏仁 三錢

茅朮炭 一錢 半夏 一錢五分

猪苓 二錢

廣木香 八分

厚樸 六分

澤瀉 一錢五分

炒扁豆 一錢五分

廣皮 五分

雲苓皮 五錢

桂枝 三錢

南查炭 二錢

蒼朮炭 三錢

猪苓 三錢

小枳實 二錢

炒神麴 四錢

澤瀉 三錢

廣皮炭 四錢

川椒炭 二錢

一月後覆診病已大愈善後方與調理脾胃

咳嗽

癸亥七月十一日 郭男 咳而嘔胃咳也痰涎湧塞喘滿氣短

半夏 三錢

茯苓塊 三錢 薏仁 三錢

杏仁 二錢

小枳實一錢 陳皮一錢 蘇梗二錢 藿香梗一錢

生薑二錢

日十八 即於前方內去藿香梗蘇梗加

半夏二錢 苦葶藶五分 蘇子二錢 再服一帖

日二十 小兒脾虛溼重胃咳

茯苓塊三錢 半夏六錢 焦神麴二錢 生薏仁五錢

杏仁三錢 蘇子霜一錢 旋覆花錢包三 扁豆三錢

生薑汁每次沖 小枳實一錢 五分

日二 即於前方內去焦神麴加

杏仁二錢 蘇子霜一錢 廣皮三錢 服十帖

吳三歲 五歲 八歲 上三幼孩連咳數十聲不止八歲者且與千金葶

葶湯加苦葶藶子三錢有二帖愈者有三四帖愈者第三四帖減葶藶子

之半甚喘者加白茅根 五錢

文四幼孩喘咳數日不止百藥不效用千金葦莖湯加苦葶藶子二帖而愈  
周女計春風喘咳醫用麻黃向外發又用訶子白果百合向內收以致喘不可  
解吐出者皆血沫用金沸草湯三帖而愈

乙酉五月 劉十七 三月間春溫喘咳見血現在六脈弦細五更丑寅卯時單聲

咳嗽甚謂之木扣金鳴風本生於木也議辛甘化風甘涼柔木

連翹 三錢 細生地 三錢 薄荷 一錢 銀花 二錢

苦桔梗 三錢 桑葉 三錢 天冬 一錢 茶菊花 三錢

甘草 二錢 麥冬 三錢 鮮蘆根 三錢

廿八日 咳減食加脈猶洪數左大於右效不更方再服四五帖

六月初 木扣金鳴與柔肝清肺已效左脈洪數已減於前方去氣分辛藥加甘

霜

沙參 三錢

麥冬 三錢

冰糖 三錢

玉竹 三錢

己丑二月初十日 李女 風溫夾痰飲喘咳壯熱太甚勢甚危急勉與宣肺清肺熱

法

生石膏末 二兩

杏仁 五錢

蘆根 五錢

苦葶藶子 三錢

黃芩 三錢

煎三杯分三次服

日十二 溫熱夾痰飲喘咳

生石膏 二錢

杏仁 四錢

茯苓皮 三錢

苦葶藶 錢五分

蘆根 五錢

冬瓜仁 三錢

煮三小杯分三次服服此方二帖而燒退

暑溫

癸亥六月十二日 史男 右脈洪大無倫暑傷手太陰有逆傳心包之勢喘渴太甚煩

躁不寧時有譫語身熱且嘔議兩清心營肺衛之熱

吳天醫案

一 咳 暑溫

完

連翹連心一錢

生石膏三錢 厚樸一錢

銀花二錢

杏仁泥二錢

川連一錢 知母一錢

藿香梗一錢

竹葉一錢

丹皮一錢 生甘草八分

日二帖

十三諸症俱減熱已退但右脈仍洪舌黃而滑嘔未盡除

飛滑石一錢

連翹一錢 川黃連一錢

杏仁泥一錢

銀花一錢

生甘草八分 生薏仁二錢

葦根三錢

荷葉一錢

炒知母八分 二帖

癸亥七月初二日 興男三歲 暑溼傷脾暮夜不安小兒脈當數而反不數且少腹以下常

腫痛肝腎亦復虛寒況面色青黃舌苔白手心時熱調理乳食要緊防成

疳疾讓腑以通為補食非溫不化例

生薏仁二錢

半夏炒一錢 小枳實八分

杏仁泥一錢

厚樸一錢

白薏仁四分 焦神麩一錢

扁豆炒一錢

廣皮炭 八分

小茴香 炒 一  
生薑 煨 三  
小片

雞內金 一錢

四帖

初大前證已愈惟脾胃虛弱以疏補中焦為主

田十四暑濕誤下寒涼太多洞泄之後關開不藏墮食隨便完穀絲毫不能

弦與桃花湯改粥法

人參

赤石脂 末

乾薑

甘草 炙

禹餘糧 細末

粳米

先以人參甘草乾薑三味煎去渣湯煮粥成然後和入赤石脂禹餘糧末愈後補脾陽而大健

伏暑

周歲五本係伏暑誤以為風寒挾食發表消導致邪氣深入下焦血分夜熱早涼

與煎厥瘧瘧相似食減脈大汗多便結先與救陽明之陰

吳氏醫案

八暑濕

伏暑

辛

元參 五錢

梨汁 一杯 酒

荸薺汁 一杯 酒

麥冬 五錢 不去心

藕汁 一杯 清

藍根汁 一杯 酒

三帖

丁亥八月 台氏歲十六 伏暑內發新涼外加誤與三陽經表藥以致謬語神昏前

用芳香開包絡神識已清惟舌苔白厚腹脹熱未盡除與通宣三焦法

雲苓皮 五錢

厚樸 二錢

藿香梗 三錢

飛滑石 五錢

香附 二錢

炒黃芩 二錢

杏仁泥 三錢

廣皮 二錢

白薏仁 一錢

生薏仁 五錢

煮三杯分三次服 二帖

十四 伏暑新涼今日新涼之邪已退而伏暑之溼邪未除腹未全消故知之

雲苓皮 五錢

薏仁 五錢

大腹皮 三錢

薑半夏 三錢

豬苓 三錢

黃芩炭 二錢

杏仁泥 二錢

厚樸 三錢

白薏仁 五錢

藿香梗 三錢

廣皮 三錢

煮三杯分三次服 二帖

吳鞠通先生醫案卷四終